Инструкция по применению
Аспаркам Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия и магния аспарагинат
Количество в упаковке: 1



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской, с риской на одной стороне и гравировкой "R" или без нее - на другой.

Действующее вещество

Калия и магния аспарагинат

Состав

Состав на одну таблетку: Аспаркам 500 мг [магния аспарагинат тетрагидрат 177 мг калия аспарагинат гемигидрат 177 мг вспомогательные вещества: крахмал картофельный 131 мг тальк 10 мг кальция стеарат] 5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция Легко всасывается при приеме внутрь. Элиминация Относительно быстро выводится почками.

Показания

Аспаркам показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для устранения дефицита калия и магния в составе комбинированной терапии при: различных проявлениях ишемической болезни сердца (включая инфаркт миокарда) хронической сердечной недостаточности нарушениях ритма сердца (включая аритмии, вызванные передозировкой сердечных гликозидов).

Способ применения и дозы

Аспаркам принимают внутрь после еды по 1-2 таблетке 3 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости курс повторяют.

Противопоказания

Гиперчувствительность к магния аспарагинату, калия аспарагинату или к любому из вспомогательных веществ нарушение обмена аминокислот острая и хроническая почечная недостаточность гиперкалиемия, гипермагниемия недостаточность коры надпочечников нарушение атриовентрикулярной проводимости (AV блокада I-III ст.) болезнь Аддисона шок (включая кардиогенный) острый метаболический ацидоз обезвоживание тяжелая миастения гемолиз артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст.) период грудного вскармливания возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых исследований применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания не проводилось. Беременность Применение калия аспарагината + магния аспарагината во время беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. Лактация Калия аспарагинат + магния аспарагинат проникают в грудное молоко. При необходимости применения препарата в период лактации, грудное вскармливание необходимо прекратить.

Побочные действия

Нарушения со стороны сердца: атриовентрикулярная блокада, парадоксальная реакция (увеличение числа экстрасистол). Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: диспноэ. Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, боль в животе, метеоризм, изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: кожный зуд, повышенное потоотделение. Общие нарушения и реакции в месте введения: астения. Лабораторные и инструментальные данные: гиперкалиемия (проявляющаяся тошнотой, рвотой, диареей, парестезиями), гипермагниемия (проявляющаяся покраснением кожи лица, чувством жажды, снижением артериального давления, гипорефлексией, угнетением дыхания, судорогами).

Передозировка

Возрастает риск возникновения симптомов гиперкалиемии и гипермагниемии. Симптомы гиперкалиемии Повышенная утомляемость, миастения, парестезия, спутанность сознания, нарушение сердечного ритма (брадикардия, атриовентрикулярная блокада, аритмии, остановка сердца). Симптомы гипермагниемии Снижение нервно-мышечной возбудимости, тошнота, рвота, летаргия, снижение артериального давления. При резком повышении содержания ионов магния в крови: угнетение глубоких сухожильных рефлексов, паралич дыхания, кома. Лечение Симптоматическая терапия - внутривенное введение кальция хлорида в дозе 100 мг / мин при необходимости - гемодиализ.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое взаимодействие При совместном применении с калийсберегающими диуретиками (например, спиронолактон, эплеренон, триамтерен, амилорид), бета-адреноблокаторами, циклоспорином, гепарином, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, нестероидными противовоспалительными препаратами повышается риск развития гиперкалиемии вплоть до развития аритмии и асистолии. Одновременное применение препаратов калия совместно с глюкокортикостероидами устраняет гипокалиемию, вызываемую последними. Калий уменьшает нежелательные эффекты сердечных гликозидов. Калия аспарагинат+магния аспарагинат усиливает отрицательное дромо- и батмотропное действие антиаритмических лекарственных средств. Магний снижает эффекты неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина. Анестетики увеличивают угнетающее действие препаратов магния на центральную нервную систему при одновременном применении с атракуронием, декаметонием, сукцинилхлоридом и суксаметонием возможно усиление нервно-мышечной блокады. Кальцитриол повышает содержание ионов магния в плазме крови, препараты кальция снижают эффект препаратов магния. Фармакокинетическое взаимодействие Лекарственные средства, обладающие вяжущим и обволакивающим действием, уменьшают всасывание магния аспарагината и калия аспарагината в желудочно-кишечном тракте, поэтому необходимо соблюдать трехчасовой интервал между приемом внутрь калия аспарагината+магния аспарагината с указанными выше лекарственными средствами.

Особые указания

Особого внимания требуют пациенты с заболеваниями, сопровождающимися гиперкалиемией: необходим регулярный контроль содержания калия в плазме крови. При одновременном применении с лекарственными средствами, которые могут повышать содержание калия в крови, необходим регулярный контроль содержания калия в плазме крови. При появлении кожного зуда и гиперемии кожи, слабости в мышцах лечение необходимо прекратить и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Влияние калия аспарагината+магния аспарагината на способность к управлению транспортными средствами и механизмами не изучалось. Не ожидается влияния на способность управлять транспортными средствами и на работу с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.