Инструкция по применению
Аспаркам Таблетки 24 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия и магния аспарагинат
Количество в упаковке: 24

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской, с риской на одной стороне и гравировкой "R" или без нее - на другой.

Действующее вещество

Калия и магния аспарагинат

Состав

Состав на одну таблетку.Аспаркам - 500 мг[магния аспарагинат тетрагидрат - 177 мгкалия аспарагинат гемигидрат - 177 мгвспомогательные вещества:крахмал картофельный - 131 мгтальк - 10 мгкальция стеарат] - 5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Легко всасывается при приеме внутрь и относительно быстро выводится с мочой.

Показания

Аспаркам применяется в комплексной терапии при сердечной недостаточности ишемической болезни сердца гипокалиемии нарушениях сердечного ритма (в том числе при инфаркте миокарда передозировке сердечных гликозидов).

Способ применения и дозы

Аспаркам принимают внутрь после еды по 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости курс повторяют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату нарушение обмена аминокислот артериальная гипотензия острая и хроническая почечная недостаточность гиперкалиемия гипермагниемия нарушение атриовентрикулярной проводимости (атриовентрикулярная блокада I-III степени) тяжелая миастения гемолиз недостаточность коры надпочечников возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение возможно если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Возможны тошнота рвота диарея неприятные ощущения или жжение в эпигастральной области (у больных анацидным гастритом или холециститом) гиперкалиемия (тошнота рвота диарея парастезии) гипермагниемия (покраснение лица чувство жажды снижение артериального давления гипорефлексия мышечная слабость парез кома арефлексия угнетение дыхания судороги).

Передозировка

Симптомы: нарушение проводимости (особенно при предшествующей патологии проводящей системы сердца).Лечение: внутривенное введение кальция хлорида, при необходимости - гемодиализ и перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое: совместное применение с калийсберегающими диуретиками (триамтерен спиронолактон) бета-адреноблокаторами циклоспорином гепарином ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента нестероидными противовоспалительными препаратами повышает риск развития гиперкалиемии вплоть до развития аритмии и асистолии. Применение препаратов калия совместно с глюкокортикостероидами устраняет гипокалиемию вызываемую последними. За счёт содержания ионов калия уменьшаются нежелательные эффекты сердечных гликозидов.За счёт содержания ионов магния снижает эффект неомицина полимиксина В тетрациклина и стрептомицина.При одновременном применении препарат может усиливать нервно-мышечную блокаду вызванную деполяризующими миорелаксантами (атракурия безилатом декаметония бромидом суксаметония (хлоридом бромидом йодидом)).Кальцитриол повышает содержание ионов магния в плазме крови, препараты кальция снижают эффект препаратов магния. Фармакокинетическое: вяжущие и обволакивающие средства снижают всасывание препарата в желудочно-кишечном тракте.

Особые указания

При нарушениях сердечного ритма в сочетании с предсердно-желудочковой блокадой применять Аспаркам не рекомендуется.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.