Инструкция по применению
Аспаркам Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармапол-Волга
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия и магния аспарагинат
Количество в упаковке: 50

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета с риской и фаской.

Действующее вещество

Калия и магния аспарагинат

Состав

1 таблетка содержит: Действующие вещества: калия аспарагината гемигидрат - 175 мг, магния аспарагината тетрагидрат - 175 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 135 мг, тальк - 10 мг, кальция стеарат - 5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция Калия аспарагинат и магния аспарагинат интенсивно всасываются в кишечнике, преимущественно в тонкой кишке. Элиминация Выводятся почками.

Показания

Для устранения дефицита калия и магния в составе комбинированной терапии при: различных проявлениях ишемической болезни сердца (включая инфаркт миокарда) хронической сердечной недостаточности нарушениях ритма сердца (включая аритмии, вызванные передозировкой сердечных гликозидов).

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая достаточным количеством воды, не разжевывая. Принимать после приема пищи, т.к. кислая среда желудка снижает его эффективность. По 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели. По рекомендации врача курс повторяют. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к калия аспарагинату, магния аспарагинату и/или другим компонентам препарата острая и хроническая почечная недостаточность гиперкалиемия гипермагниемия болезнь Аддисона атриовентрикулярная блокада I-III степени шок (включая кардиогенный) артериальная гипотензия (артериальное давление менее 90 мм рт. ст.) нарушение обмена аминокислот тяжелая миастения гемолиз острый метаболический ацидоз обезвоживание возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены) период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Адекватных и строго контролируемых исследований применения препарата во время беременности не проводилось. Применение калия и магния аспарагината во время беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка. Период грудного вскармливания Адекватных и строго контролируемых исследований применения препарата в период грудного вскармливания не проводилось. Калия и магния аспарагинат проникает в грудное молоко. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания, грудное вскармливание необходимо прекратить (см. раздел «Противопоказания»).

Побочные действия

Частота побочных реакций приведена в виде следующей градации: очень часто (⩾ 1 /10) часто (⩾ 1/100 до нечасто (⩾ 1/1000 до редко (⩾ 1/10 000 до очень редко (частота неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных). Нарушения со стороны сердца Частота неизвестна: атриовентрикулярная блокада, парадоксальная реакция (увеличение числа экстрасистол). Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения Частота неизвестна: диспноэ. Желудочно-кишечные нарушения Частота неизвестна: тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, боль в животе, метеоризм, изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей Частота неизвестна: кожный зуд, повышенное потоотделение. Общие нарушения и реакции в месте введения Частота неизвестна: астения. Лабораторные и инструментальные данные Частота неизвестна: гиперкалиемия (проявляющаяся тошнотой, рвотой, диареей, парестезиями), гипермагниемия (проявляющаяся покраснением кожи лица, чувством жажды, снижением артериального давления, гипорефлексией, угнетением дыхания, судорогами). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Возрастает риск возникновения симптомов гиперкалиемии и гипермагниемии. Симптомы Симптомы гиперкалиемии Повышенная утомляемость, миастения, парестезия, спутанность сознания, нарушение сердечного ритма (брадикардия, атриовентрикулярная блокада, аритмии, остановка сердца). Симптомы гипермагниемии Снижение нервно-мышечной возбудимости, тошнота, рвота, летаргия, снижение артериального давления. При резком повышении содержания ионов магния в крови: угнетение глубоких сухожильных рефлексов, паралич дыхания, кома. Лечение Симптоматическая терапия - внутривенное введение кальция хлорида в дозе 100 мг/мин при необходимости - гемодиализ.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое взаимодействие При совместном применении с калийсберегающими диуретиками (например, спиронолактон, эплеренон, триамтерен, амилорид), бета-адреноблокаторами, циклоспорином, гепарином, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, нестероидными противовоспалительными препаратами повышается риск развития гиперкалиемии вплоть до развития аритмии и асистолии. Одновременное применение препаратов калия с глюкокортикостероидами устраняет гипокалиемию, вызываемую последними. Калий уменьшает нежелательные эффекты сердечных гликозидов. Калия и магния аспарагинат усиливает отрицательное дромо- и батмотропное действие антиаритмических лекарственных средств. Магний снижает эффекты неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина. Анестетики увеличивают угнетающее действие препаратов магния на центральную нервную систему при одновременном применении с атракуронием, декаметонием, сукцинилхлоридом и суксаметонием возможно усиление нервно-мышечной блокады. Кальцитриол повышает содержание ионов магния в плазме крови, препараты кальция снижают эффект препаратов магния. Фармакокинетическое взаимодействие Лекарственные средства, обладающие вяжущим и обволакивающим действием, уменьшают всасывание магния аспарагината и калия аспарагината в желудочно-кишечном тракте, поэтому необходимо соблюдать трехчасовой интервал между приемом внутрь калия и магния аспарагината с указанными выше лекарственными средствами.

Особые указания

Особого внимания требуют пациенты с заболеваниями, сопровождающимися гиперкалиемией: необходим регулярный контроль содержания калия в плазме крови. При одновременном применении с лекарственными средствами, которые могут повышать содержание калия в крови, необходим регулярный контроль содержания калия в плазме крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). При появлении кожного зуда и гиперемии кожи, слабости в мышцах лечение необходимо прекратить и обратиться к врачу. Влияние калия и магния аспарагината на способность к управлению транспортными средствами и механизмами не изучалось. Не ожидается влияния на способность управлять транспортными средствами и на работу с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.