Инструкция по применению
Аспаркам Авексима Таблетки 56 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия и магния аспарагинат
Количество в упаковке: 56
Дозировка действующего вещества: 175 мг+175 мг



Действующее вещество

Калия и магния аспарагинат

Состав

Калия аспарагинат гемигидрат 175 мгмагния аспарагинат тетрагидрат 175 мгвспомогательные вещества: крахмал картофельный - 88 мг, стеариновая кислота - 5 мг, макрогол 4000 - 7 мг, кремния диоксид коллоидный - 50 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

АСПАРКАМ АВЕКСИМА применяют в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипокалиемии, нарушений сердечного ритма (в том числе при инфаркте миокарда, передозировке сердечных гликозидов).

Способ применения и дозы

Назначают внутрь после еды. Взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день. Курс лечения – 3-4 недели. При необходимости курс повторяют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату;нарушение обмена аминокислот;острая и хроническая почечная недостаточность;гиперкалиемия;гипермагниемия; недостаточность коры надпочечников;нарушение атриовентрикулярной проводимости (AV блокада I-IIIст.);тяжелая миастения;гемолиз;артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст.);возраст до 18 лет.С осторожностью: беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью.

Побочные действия

Возможны тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения или жжение в поджелудочной области (у больных анацидным гастритом или холециститом), атриовентрикулярная блокада, парадоксальная реакция (увеличение числа экстрасистол), гиперкалиемия (тошнота, рвота, диарея, парастезии), гипермагниемия (покраснение кожи лица, чувство жажды, снижение артериального давления, мышечная слабость, повышенная утомляемость, парез, кома, арефлексия, угнетение дыхания, судороги).

Передозировка

Симптомы: гиперкалиемия, гипермагниемия.Лечение: в/в кальция хлорид, при необходимости – гемодиализ и перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими препаратами

ФармакодинамическиеСовместное применение с калийсберегающими диуретиками (триамтерен, спиронолактон), бета-адреноблокаторами, циклоспорином, гепарином, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, нестероидными противовоспалительными препаратами повышает риск развития гиперкалиемии вплоть до развития аритмии и асистолии.Пременение препаратов калия совместно с глюкокортикостероидами устраняет гипокалиемию, вызываемую последними.За счет содержания ионов калия уменьшаются нежелательные эффекты сердечных гликозидов.За счет содержания ионов магния снижает эффект неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина.Может усиливать нервно-мышечную блокаду, вызываемую деполяризующими миорелаксантами (атракурия безилатом, декаметония бромидом, суксаметония (хлоридом, бромидом, йодидом).Кальцитриол повышает концентрацию ионов магния в плазме крови, препараты кальция снижают эффект магния.ФармакокинетическиеВяжущие и обволакивающие средства уменьшают всасывание препарата в желудочно-кишечном тракте (необходимо соблюдать 3-часовой интервал между их приемом).

Особые указания

Необходим контроль содержания ионов калия в плазме крови.Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенной концентрации вниманияКлинических исследований по оценке влияния препарата на способность к управлению транспортными средствами и механизмами не проводилось.