Инструкция по применению
Атериксен Таблетки 100 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: 1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской с двух сторон и риской с одной стороны. Допускается наличие вкраплений более темного цвета.

Действующее вещество

1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил]пергидроазин-2,6-дион

Состав

1 таблетка содержит: действующее вещество: 1-[2-(1-Метилимидазол-4-ил)-этил] пергидроазин-2,6-дион (XC221GI) – 100 мг вспомогательные вещества: лактоза (лактопресс), карбоксиметилкрахмал натрия, тальк, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика Всасывание Действующее вещество быстро поступает в кровь из желудочно-кишечного тракта. В исследовании у здоровых добровольцев при однократном приеме препарата в дозе 200 мг максимальная концентрация (Cmax) составила 671 ± 509 нг/мл время ее достижения (Tmax) – 0,25-1,5 ч. (медиана 0,5 ч.). Распределение Практически не связывается с белками плазмы крови. При многократном введении в режиме один раз в сутки практически не накапливается в плазме крови. Метаболизм В организме подвергается незначительному гидролизу. Не метаболизируется в печени. Не влияет на систему цитохромов печени человека. Выведение В исследовании у здоровых добровольцев период полувыведения (T1/2) как при однократном, так и многократном (в течение 5 дней) приеме препарата в дозе 200 мг составил 1,2 ± 0,2 ч. В доклинических исследованиях было установлено, что основной процесс выведения происходит через почки (через 48 часов с мочой выводится около 31 % от введенной дозы, с калом # 0,1 %).

Показания

Лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) легкого течения у взрослых. Лечение неосложненного гриппа легкой и средней степени тяжести и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у взрослых.

Способ применения и дозы

Внутрь. Прием препарата начинают с момента появления первых симптомов заболевания, предпочтительно не позднее 36 ч от начала болезни. COVID-19 легкого течения По 100 мг 2 раза в день. Курс лечения – 14 дней. Грипп и другие ОРВИ По 100 мг 2 раза в день. Курс лечения – 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Нарушение функции печени и/или почек (клинические исследования у данной категории пациентов не проводились). Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность у детей не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности не изучалось, поэтому применение препарата при беременности противопоказано. Применение препарата во время лактации не изучалось, поэтому при необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто (⩾1/10), часто (от ⩾1/100 до Нарушения со стороны крови и лимфатической системы Часто: базофилия, эозинофилия, повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК), снижение количества нейтрофилов. Нарушения со стороны нервной системы Часто: головокружение, дисгевзия. Желудочно-кишечные нарушения Часто: жидкий стул, диспепсия, тошнота. Нарушения со стороны сосудов Часто: эпистаксис. Общие нарушения и реакции в месте введения Часто: усталость. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Атериксен до настоящего времени не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинические исследования лекарственных взаимодействий препарата Атериксен не проводились.

Особые указания

Применение препарата Атериксен возможно только под наблюдением врача. При развитии побочного действия необходимо сообщать об этом в установленном порядке для осуществления мероприятий по фармаконадзору. Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.