Инструкция по применению
Атифин таблетки 250мг N28

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тербинафин
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Действующее вещество

Тербинафин

Состав

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с насечкой на одной стороне и фаской. 1 таб. тербинафин (в форме гидрохлорида) 250 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, повидон, тальк (магния гидросиликат), кремний коллоидный безводный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— микозы волосистой части головы (трихофития, микроспория) . — микозы кожи и ногтей (трихофития, микоспория, эпидермофития) . — онихомикозы . — тяжелые распространенные дерматомикозы гладкой кожи туловища и конечностей, требующие системного лечения . — кандидозы кожи и слизистых оболочек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности из-за отсутствия достаточного количества данных о безопасности применения тербинафина у беременных. Противопоказано применение препарата в период грудного вскармливания, поскольку тербинафин выделяется с грудным молоком.

Побочные действия

Побочные реакции обычно средней и легкой степени тяжести и носят временный характер. Часто встречающиеся побочные реакции Со стороны системы пищеварения: чувство переполненного желудка, диспепсия, тошнота, потеря аппетита, боли в животе, диарея . иногда - нарушение вкусового восприятия (в т.ч. потеря его, которая восстанавливается через несколько недель после прекращения лечения) . редко - холестатическая желтуха, гепатит, бессимптомное увеличение уровня трансаминаз печени. Несмотря на недоказанность причинной связи этих нарушений с применением тербинафина, в случае развития гепатобилиарной дисфункции лечение Атифином следует прекратить. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко - парестезия, гипостезия, головокружение . очень редко - депрессия, чувство повышенной тревоги. Со стороны костно-мышечной системы: часто - артралгия, миалгия. Со стороны системы кроветворения: очень редко - нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения. Аллергические реакции: часто - крапивница, многоформная эритема, редко - системные аллергические реакции (реакции подобные сывороточной болезни, ангионевротический отек), очень редко - тяжелые кожные реакции (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, фоточувствительность). При прогрессировании кожных высыпаний лечение тербинафином следует прекратить. Прочие: часто - головная боль, плохое самочувствие, чувство усталости . очень редко - обострение псориаза, усиленное выпадение волос.

Особые указания

Побочные реакции обычно средней и легкой степени тяжести и носят временный характер. Часто встречающиеся побочные реакции Со стороны системы пищеварения: чувство переполненного желудка, диспепсия, тошнота, потеря аппетита, боли в животе, диарея . иногда - нарушение вкусового восприятия (в т.ч. потеря его, которая восстанавливается через несколько недель после прекращения лечения) . редко - холестатическая желтуха, гепатит, бессимптомное увеличение уровня трансаминаз печени. Несмотря на недоказанность причинной связи этих нарушений с применением тербинафина, в случае развития гепатобилиарной дисфункции лечение Атифином следует прекратить. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко - парестезия, гипостезия, головокружение . очень редко - депрессия, чувство повышенной тревоги. Со стороны костно-мышечной системы: часто - артралгия, миалгия. Со стороны системы кроветворения: очень редко - нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения. Аллергические реакции: часто - крапивница, многоформная эритема, редко - системные аллергические реакции (реакции подобные сывороточной болезни, ангионевротический отек), очень редко - тяжелые кожные реакции (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, фоточувствительность). При прогрессировании кожных высыпаний лечение тербинафином следует прекратить. Прочие: часто - головная боль, плохое самочувствие, чувство усталости . очень редко - обострение псориаза, усиленное выпадение волос.