Инструкция по применению
Атрикан капсулы 250мг N8

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Innothera Chouzy
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тенонитрозол
Количество в упаковке: 8
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Тенонитрозол

Состав

Тенонитрозол 250 мг;Вспомогательные вещества: масло арахиса - 194 мг, масло соевых бобов гидрогенизированное - 6 мг, лецитин соевый - 5 мг.;Состав оболочки капсул: желатин - 134 мг, сорбитола и сорбитанов раствор - 66 мг, титана диоксид (E171) - 1.5 мг, краситель железа оксид желтый (E172) - 1 мг, глицерол - 3.5 мг, гипромеллозы фталат - 30 мг, дибутилфталат - 5.2 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Трихомониаз мочеполовой системы (у женщин и мужчин).

Способ применения и дозы

Внутрь по 200-250 мг 2-3 раза/сут во время еды, интравагинально по 100 мг 1-2 раза /сут. Длительность лечения определяется индивидуально.

Противопоказания

Выраженные нарушения функции печени, повышенная чувствительность к тенонитрозолу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.; Препарат выделяется с грудным молоком, поэтому при необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, ухудшение аппетита, чувство дискомфорта в области эпигастрия при приеме внутрь; возможно желтоватое окрашивание склер.;Прочие: очень редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с лекарственными препаратами, содержащими этанол.

Особые указания

Необходимо проводить одновременное лечение полового партнера. Во время лечения тенонитрозолом не рекомендуется ношение контактных линз. В процессе лечения запрещается употребление алкоголя. Если проводилось несколько курсов терапии тенонитрозолом, то по завершении лечения рекомендуется контроль картины периферической крови. Тенонитрозол не рекомендуется применять одновременно с дисульфирамом.

Условия хранения

В сухом месте