Инструкция по применению
Авиандр Таблетки 20 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ИИХР
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Маритупирдин
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро таблетки белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Маритупирдин

Состав

Препарат АВИАНДР, содержит Действующим веществом является: 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индола гидрохлорид. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 20 мг 2,8-диметил-5-(2-фенилэтил)-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индол (в виде гидрохлорида). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: ядро таблетки: лактоза безводная касторовое масло гидрогенизированное крахмал картофельный пленочная оболочка (Опадрай 03F180011 белый): гипромеллоза титана диоксид (Е171) макрогол-6000.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат АВИАНДР, показан к применению у взрослых старше 18 лет для лечения: генерализованного тревожного расстройства. При тревожных состояниях после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19): у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации, легкой и средней степени выраженности.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Лечение генерализованного тревожного расстройства Препарат АВИАНДР, применяют внутрь по 1 таблетке (20 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером). Поскольку генерализованное тревожное расстройство является заболеванием с хроническим течением, продолжительность лечения определяется врачом. Лечение тревожных состояний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19): у пациентов с ведущей жалобой на тревогу, изменение фона настроения, вспыльчивость и раздражительность, у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации, легкой и средней степени выраженности. Препарат АВИАНДР, применяют внутрь по 1 таблетке (20 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность курсового применения препарата составляет 4 недели. При необходимости, по рекомендации врача, длительность лечения может быть увеличена до 6 недель. Путь и способ введения Препарат АВИАНДР, принимается внутрь, за 30 минут до еды. Продолжительность терапии Продолжительность курса лечения определяется врачом, в зависимости от Вашего состояния и диагноза.

Противопоказания

Тщательно соблюдайте все инструкции лечащего врача. Они могут отличаться от общей информации, представленной в данном листке-вкладыше. Не принимайте препарат АВИАНДР,:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность: Не принимайте препарат АВИАНДР,, он противопоказан при беременности. Грудное вскармливание: Не принимайте препарат АВИАНДР,. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания (лактации), грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат АВИАНДР, может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Большинство нежелательных реакций являются легкими или умеренными. Они обычно наступают в течение первых двух недель лечения и являются преходящими. Перечень нежелательных реакции: Ниже представлены возможные нежелательные реакции по частоте возникновения. Если эти нежелательные реакции будут протекать в тяжелой форме, обратитесь к врачу, фармацевту или медицинскому работнику. Часто (могут возникать не более чему 1 человека из 10) Нечасто (могут возникать не более чему 1 человека из 100) Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата АВИАНДР, больше, чем следовало Данные о случаях передозировки отсутствуют. В случае передозировки возможны головокружение, общая слабость, сонливость, угнетение уровня сознания. Если Вы приняли большую, чем следовало дозу препарата АВИАНДР,, немедленно обратитесь к врачу. В течение 1,5 часов после приема повышенной дозы препарата примите активированный уголь или промойте желудок. Специального антидота при интоксикации или передозировке не существует. В случае передозировки Ваш врач назначит Вам симптоматическую терапию для поддержания жизненно важных функций организма. Если Вы забыли принять препарат АВИАНДР, Если Вы пропустили прием препарата, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Просто примите следующую дозу в обычное время. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе препараты, отпускаемые 'false. Препарат АВИАНДР, может взаимодействовать с другими препаратами. В результате может меняться количество препарата АВИАНДР, или других препаратов в Вашей крови. Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов: Взаимодействие с пищей и напитками Препарат АВИАНДР, принимается за 30 минут до еды. В период лечения следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Особые указания

Лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу, который способствует быстрому выявлению новых сведений о безопасности. Вы можете помочь, сообщая о любых нежелательных реакциях, которые возникли в период применения лекарственного препарата (в том числе и о случаях его неэффективности). Способ сообщения о нежелательных реакциях представлен в разделе 4 листка-вкладыша. Препарат АВИАНДР, содержит лактозу и касторовое масло гидрогенизированное Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Учитывая незначительное содержание касторового масла в одной таблетке препарата, каких-либо нежелательных реакций, связанных с действием этого вспомогательного вещества, не ожидается.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении препарата противопоказано управление транспортными средствами и работа с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы дети не могли увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Храните препарат при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке (флакон, блистер) для защиты от света.