Инструкция по применению
Азидроп капли глазные 15 мг/г 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Франция
Производитель: Теа Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Азитромицин
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 15 мг/г

Действующее вещество

Азитромицин

Состав

1 г азитромицина дигидрат 15 мг, что соответствует содержанию азитромицина 14.3 мг. Вспомогательные вещества: натрия метабисульфит - 0.4 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Лечение конъюнктивитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами: — гнойные бактериальные конъюнктивиты у взрослых и детей (с рождения и до 17 лет) . — трахоматозные конъюнктивиты, вызванные Chlamydia trachomatis у взрослых и детей (с рождения и до 17 лет).

Способ применения и дозы

Взрослым закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 2 раза/сут (утром и вечером) в течение 3 дней. Если отсутствует положительная динамика в течение 3 дней применения препарата, следует проконсультироваться с врачом и пересмотреть схему лечения и диагноз. Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется. У детей коррекция дозы не требуется. Способ применения и дозы Глазные капли закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза. Пациентам необходимо следовать следующим рекомендациям: - тщательно вымыть руки перед инстилляцией препарата и после процедуры . - не следует касаться глаза и века кончиком капельницы флакона . - после одноразового использования флакон необходимо выбросить вместе с имеющимся остатком. Нельзя использовать оставшийся во флаконе раствор для следующей инстилляции.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к азитромицину и другим компонентам препарата — повышенная чувствительность к другим антибиотикам группы макролидов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Поскольку системная экспозиция азитромицина незначительна, негативного влияния препарата при беременности не ожидается. Применение препарата Азидроп, капли глазные, у беременных возможно. Имеются ограниченные данные о том, что азитромицин выделяется с грудным молоком, но, учитывая низкие дозы и низкую системную доступность, доза, попадающая в организм новорожденных, является крайне незначительной. Таким образом, применение препарата Азидроп в период грудного вскармливания допустимо. Данные исследований на животных не подтвердили влияния азитромицина на фертильность мужчин и женщин. Результаты исследований у человека отсутствуют. Поскольку системное воздействие азитромицина на организм незначительно, влияния препарата на фертильность не ожидается.

Побочные действия

Побочные реакции, которые наблюдались в клинических исследованиях и пострегистрационных исследованиях Со стороны иммунной системы: нечасто (&#8805 . 1/1000, меньше 1/100) - гиперчувствительность. Со стороны органа зрения: очень часто (&#8805 . 1/10) - глазной дискомфорт (зуд, жжение, покалывание) после закапывания препарата . часто (&#8805 .1/100, меньше 1/10) - затуманивание зрения, ощущение "слипания век", инородного тела в глазу после закапывания препарата . нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - гиперемия конъюнктивы, слезотечение, эритема век. Побочные реакции, которые наблюдались в пострегистрационных исследованиях Включение приведенных нежелательных реакций основывается на пострегистрационных данных. Частота определена, исходя из 3/X, где X представляет собой общий размер выборки, суммированной по всем релевантным клиническим исследованиям, которая при 3/879 дает категорию "нечасто". Со стороны иммунной системы: нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - ангионевротический отек (отек Квинке). Со стороны органа зрения: нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - конъюнктивит, аллергический конъюнктивит, кератит, экзема век, отек век, глазная аллергия. Профиль нежелательных реакций у детей соответствует взрослой популяции, никаких побочных эффектов не было выявлено. Профиль безопасности для разных педиатрических групп был также идентичен.

Особые указания

Побочные реакции, которые наблюдались в клинических исследованиях и пострегистрационных исследованиях Со стороны иммунной системы: нечасто (&#8805 . 1/1000, меньше 1/100) - гиперчувствительность. Со стороны органа зрения: очень часто (&#8805 . 1/10) - глазной дискомфорт (зуд, жжение, покалывание) после закапывания препарата . часто (&#8805 .1/100, меньше 1/10) - затуманивание зрения, ощущение "слипания век", инородного тела в глазу после закапывания препарата . нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - гиперемия конъюнктивы, слезотечение, эритема век. Побочные реакции, которые наблюдались в пострегистрационных исследованиях Включение приведенных нежелательных реакций основывается на пострегистрационных данных. Частота определена, исходя из 3/X, где X представляет собой общий размер выборки, суммированной по всем релевантным клиническим исследованиям, которая при 3/879 дает категорию "нечасто". Со стороны иммунной системы: нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - ангионевротический отек (отек Квинке). Со стороны органа зрения: нечасто (&#8805 .1/1000, меньше 1/100) - конъюнктивит, аллергический конъюнктивит, кератит, экзема век, отек век, глазная аллергия. Профиль нежелательных реакций у детей соответствует взрослой популяции, никаких побочных эффектов не было выявлено. Профиль безопасности для разных педиатрических групп был также идентичен.