# Инструкция по применению
# Азопт Капли глазные 1% 5 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Суспензия
Страна: Бельгия
Производитель: Новартис Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бринзоламид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 1.0

## Действующее вещество

Бринзоламид

## Состав

Капли глазные 1% 1 мл:Бринзоламид 10 мгВспомогательные вещества: маннитол, карбомер 974Р, тилоксапол, динатрия эдетат, натрия хлорид, хлороводородной кислоты и/или натрия гидроксида раствор (для поддержания уровня pH), вода очищенная, бензалкония хлорид 0.01% (в качестве консерванта).

## Форма выпуска

Суспензия

**Фармакокинетика**

ВсасываниеПри местном применении бринзоламид всасывается в системный кровоток.РаспределениеСвязывание с белками плазмы составляет 60%. МетаболизмБринзоламид абсорбируется в эритроцитах за счет избирательного связывания с карбоангидразой II.Метаболизируется с образованием N-дезэтилбринзоламида, который связывается с карбоангидразой (в основном с карбоангидразой-I) и также накапливается в эритроцитах.Поскольку бринзоламид и его метаболит накапливаются в эритроцитах, их концентрация в плазме крови ниже предела количественного определения (меньше10 нг/мл).ВыведениеТ1/2 составляет 111 дней. Бринзоламид выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов - основного (N-дезэтилбринзоламид) и небольших концентраций других метаболитов (N-дезметоксипропил и О-десметил).

**Показания**

Для снижения повышенного внутриглазного давления при:- открытоугольной глаукоме; - глазной гипертензии.

**Способ применения и дозы**

Препарат закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или глаз) 2 раза/сут.Перед применением препарата флакон следует встряхнуть.

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения Азопта у беременных женщин не проводилось. Поэтому применение препарата Азопт при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Неизвестно, выделяется ли бринзоламид с грудным молоком. Поэтому при необходимости назначения Азопта в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Со стороны органа зрения: 5-10% - затуманивание зрения; 1-5% - блефарит, кератит, сухость глаз, гиперемия, ощущение инородного тела в глазу, выделения из глаз, дискомфорт, боль, зуд глаз; меньше1% - конъюнктивит, кератоконъюнктивит, кератопатия, начальные симптомы блефарита (слипание век или корочки на краях век), слезотечение, диплопия, астенопия.Со стороны пищеварительной системы: 5-10% - горький, кислый или необычный вкус во рту; меньше1% - сухость во рту, диспепсия, тошнота, диарея.Со стороны дыхательной системы: 1-5% - ринит; меньше1% - одышка, фарингит.Со стороны сердечно-сосудистой системы: меньше1% - боль в груди, гипертензия.Со стороны мочевыделительной системы: меньше1% - боль в почках.Аллергические реакции: меньше1% - крапивница.Прочие: 1-5% - головная боль, дерматит; меньше1% - алопеция, головокружение.

**Передозировка**

Данных о передозировке при местном применении Азопта нет.При передозировке, вызванной случайным приемом препарата внутрь, могут возникнуть следующие симптомы: нарушение электролитного баланса, ацидоз, нарушения со стороны нервной системы.Лечение: при необходимости проводят симптоматическую терапию; также необходимо контролировать pH крови, уровень электролитов (особенно калия).

**Взаимодействие с другими препаратами**

При одновременном применении Азопта и ингибиторов карбоангидразы для системного применения возможно усиление системных реакций, связанных с угнетением фермента. Поэтому не рекомендуется назначать такую комбинацию.При одновременном применении Азопта и салицилатов в высоких дозах возможны нарушения кислотно-щелочного и электролитного баланса.

**Особые указания**

С осторожностью следует назначать Азопт при тяжелых нарушениях функции печени. Поскольку Азопт и его метаболиты выводятся с мочой, препарат не рекомендуется назначать пациентам с выраженными нарушениями функции почек (ККменьше30 мл /мин).Следует учитывать, что бринзоламид является сульфаниламидом. Так как при местном применении происходит его системная абсорбция, возможно развитие побочных реакций, в т.ч. тяжелых аллергических реакций (таких как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, гепатонекроз, агранулоцитоз, апластическая анемия). Сенсибилизация организма сульфаниламидами может развиться в том случае, если препарат назначается повторно с нарушениями указаний по его применению. При развитии тяжелых побочных реакций применение препарата следует прекратить.Следует учитывать, что входящий в состав препарата Азопт бензалкония хлорид может накапливаться в контактных линзах, поэтому линзы следует снять перед закапыванием и установить обратно не раньше чем через 15 мин после применения препарата.При применении нескольких лекарственных средств интервал между закапыванием должен составлять не менее 15 мин.Не следует прикасаться к глазу кончиком капельницы флакона. Использование в педиатрииЭффективность и безопасность применения препарата Азопт у детей не установлена.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиСразу после применения Азопта может временно возникнуть затуманивание зрения. Поэтому пациенту следует соблюдать осторожность при вождении транспортных средств и при работе с техникой.

**Условия хранения**

В сухом месте