Инструкция по применению
Баклосан Таблетки 10 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Баклофен
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 36



Описание

Баклосан, 10 мг, таблетки Таблетки белого цвета, круглые, двояковыпуклые с делительной риской. Баклосан, 25 мг, таблетки Таблетки белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Баклофен

Состав

Препарат Баклосан содержит Действующим веществом является баклофен. Баклосан, 10 мг, таблетки: Каждая таблетка содержит 10 мг баклофена. Баклосан, 25 мг, таблетки: Каждая таблетка содержит 25 мг баклофена. Вспомогательными веществами являются лактозы моногидрат, картофельный крахмал, желатин, тальк, магния стеарат, этилцеллюлоза.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция – высокая. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2-3 часа после приема препарата. Связь с белками плазмы крови – 30%. Проникает через плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется в печени. Выводится почками (преимущественно в неизменном виде).

Показания

Препарат Баклосан показан к применению у взрослых и детей с 3 лет при повышении мышечного тонуса при: \- рассеянном склерозе (заболевание, при котором нарушается проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге) \- заболеваниях спинного мозга: опухоли, сирингомиелия (заболевание, при котором в спинном мозге образуются полости), болезни двигательных мотонейронов (заболевания, которые влияют на клетки, контролирующие движение мышц), травмы, миелит (воспаление спинного мозга) \- цереброваскулярных заболеваниях (заболевания, при которых поражаются сосуды головного мозга) \- церебральном параличе (заболевание, при котором движения ограничены или отсутствуют) \- менингите (воспаление головного мозга) \- черепно-мозговой травме.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. В случае пропуска очередного приема не следует принимать двойную дозу препарата.

Противопоказания

Не принимайте препарат Баклосан: * если у Вас аллергия к баклофену или к любым другим компонентам препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша) * если у Вас заболевание головного мозга, характеризующееся повторяющимися припадками (эпилепсия) * если у Вас имеются судороги (в том числе в анамнезе) * если у Вас имеется ненормальное состояние ума, которое приводит к трудностям определения того, что реально, а что нет (психоз) * если у Вас тяжелое заболевание нервной системы, в результате которого поражаются клетки головного мозга (болезнь Паркинсона) * если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки * если у Вас непереносимость некоторых сахаров * если Вы беременны или кормите ребенка грудью * если Вашему ребенку менее 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат при беременности. Грудное вскармливание Баклосан проникает в грудное молоко. Не принимайте препарат при кормлении грудью.

Побочные действия

В зависимости от частоты возникновения выделяют следующие группы побочных эффектов: очень редкие – менее 0,01%, редкие – более 0,01% и менее 0,1%, нечастые – более 0,1% и менее 1%, частые – более 1% и менее 10%, очень частые – более 10%. Со стороны нервной системы: очень частые – сонливость, седативный эффект частые – головокружение, слабость, усталость, спутанность сознания, нарушение походки, бессонница, эйфория, депрессия, астения, атаксия, тремор, галлюцинации, ночные кошмары, нистагм, сухость во рту редкие – парестезии, дизартрия частота неизвестна – синдром апноэ во время сна*. Со стороны сердечно-сосудистой системы: частые – снижение сердечного выброса, артериальная гипотензия. Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень частые – тошнота частые – рвота, запор, диарея, диспепсические явления редкие – абдоминальные боли, дисгевзия, нарушение функции печени. Со стороны дыхательной системы: частые – угнетение дыхания. Со стороны опорно-двигательного аппарата: частые – миалгия. Со стороны органов чувств: частые – парез аккомодации, зрительные нарушения. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частые – гипергидроз, сыпь. Со стороны почек и мочевыделительной системы: частые – полиурия, энурез, дизурия редкие – задержка мочи. Со стороны репродуктивной системы: редкие – эректильная дисфункция. Общие нарушения: очень редкие – гипотермия. В единичных случаях наблюдалось повышение спастичности, что расценивалось как парадоксальная реакция на препарат. *Случаи центрального синдрома апноэ во время сна наблюдались при использовании баклофена в высоких дозах (⩾ 100 мг) у пациентов с алкогольной зависимостью.

Передозировка

Симптомы: сонливость, потеря сознания, кома, угнетение дыхания спутанность сознания, галлюцинации, тревожное возбуждение (ажитация), судороги, отклонения на электрокардиограмме (феномен вспышка-подавление и трехфазные волны), нарушения аккомодации, нарушение зрачкового рефлекса генерализованная мышечная гипотония, миоклония, гипорефлексия или арефлексия судороги расширение периферических сосудов, гипотония или гипертензия, брадикардия или тахикардия, либо аритмия сердца гипотермия тошнота, рвота, диарея, гиперсекреция слюны повышение уровня печеночных ферментов, значений СГОТ (АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ), рабдомиолиз. Лечение: обильное питье, диуретики при угнетении дыхания – искусственная вентиляция легких. Специфического антидота не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. В особенности, сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете следующие препараты: * препараты, снижающие артериальное кровяное давление * препараты для лечения заболевания, которое развивается в связи с отложением в организме кристаллов мочевой кислоты (подагра) * антидепрессанты * леводопа, карбидопа (препараты для лечения болезни Паркинсона).

Особые указания

Препарат Баклосан содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата. Во время лечения следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, связанных с необходимостью повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на банке и картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.