Инструкция по применению
Бактистатин Капсулы 500 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Крафт ГРУПП
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 48.0



Описание

Бактистатин® – уникальный комплекс дополняющих друг друга 3-х природных компонентов. Метаболиты Bacillus subtilis Содержат комплекс биологически активных веществ: Природный сорбент (цеолит) Пребиотический компонент (гидролизат соевой муки) Генетически модифицированные линии сои НЕ используются!

Состав

Биологически активные метаболиты бесклеточной культуральной жидкости бактерий B.subtilis штамм 3 (содержащей в том числе витамин Е*), носитель цеолит, ферментированный гидролизат соевой муки, антислеживающий агент стеарат кальция (или аэросил), ингредиенты капсулы (желатин медицинский, титана диоксид, индиготин). (2 6 капсул содержат не менее 2,0-6,0 мг витамина Е, что соответствует 20-60% от рекомендуемого уровня суточного потребления, согласно требованиям ТР ТС 022/2011 (Приложение 2)).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника биологически активных метаболитов пробиотических микроорганизмов, дополнительного источника витамина Е, содержащей цеолит. Бактистатин® применяется в комплексной терапии в качестве средства, способствующего * нормализации микрофлоры кишечника и улучшающего функциональное состояние желудочно-кишечного тракта: * при дисбактериозах (дисбиозах) кишечника, возникающих в результате антибиотикотерапии, при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, после перенесенных кишечных инфекций, после лучевой и химиотерапии; * гастрите, гастродуодените; * хроническом панкреатите; * синдроме раздраженного кишечника; * диспепсии (тошнота, изжога, жидкий стул); * гиперхолестеринемии; * аллергических и дерматологических заболеваниях; * кишечных инфекциях; * воздействии неблагоприятных факторов для повышения неспецифической резистентности организма.

Способ применения и дозы

Взрослым По 2 капсуле 2 раза в день во время еды в течение 1 месяца. При острых кишечных расстройствах, пищевых отравлениях, при смене характера питания, приеме непривычной пищи в поездках по 2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 7 дней. Детям с 6 лет По 1 капсуле 2 раза в день во время еды в течение 1 месяца. При острых кишечных расстройствах, пищевых отравлениях, при смене характера питания, приеме непривычной пищи в поездках по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 7 дней. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом перед применением БАДа. Следует учитывать, что Бактистатин – это биологически активная добавка к пище и лекарственным средством не является.

Условия хранения

В сухом месте