Инструкция по применению
Бактистатин Капсулы 500 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Крафт ГРУПП
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 48.0



Описание

Бактистатин® — уникальный запатентованный комплекс усиливающих действие друг друга природных компонентов: пробиотика, пребиотика и сорбента. Пробиотический компонент — стерилизованная высушенная культуральная жидкость природной бактерии Bacillus subtilis – содержит комплекс биологически активных метаболитов (лизоцим, бактериоцины, каталазы и др.). Пробиотический компонент в составе Бактистатина: Природный сорбент — Цеолит — в составе Бактистатина: Цеолит обеспечивает дозированное высвобождение, адресную доставку на всем протяжении кишечника и пролонгированное действие компонентов Бактистатина®, благодаря постепенному высвобождению фиксированных на цеолите активных компонентов комплекса. Пребиотический компонент — гидролизат соевой муки — в составе Бактистатина: Благодаря своему составу, Бактистатин® обладает дезинтоксикационными свойствами, иммуномодулирующим действием, способствует биоочистке, нормализации микрофлоры и восстановлению эндоэкологии кишечника.

Состав

Биологически активные метаболиты бесклеточной культуральной жидкости бактерий B.subtilis штамм 3 (содержащей в том числе витамин Е), носитель цеолит, ферментированный гидролизат соевой муки, антислеживающий агент стеарат кальция (или аэросил), ингредиенты капсулы (желатин медицинский, титана диоксид, индиготин). 6 капсул содержат не менее 2,0-6,0 мг витамина Е, что соответствует 20-60% от рекомендуемого уровня суточного потребления, согласно требованиям ТР ТС 022/2011 (Приложение 2). Стерилизованная высушенная бесклеточная культуральная жидкость Bacillus subtilis штамм 3 — 200 мг. Природный алюмосиликат цеолит — 195 мг. Гидролизат соевой муки — 100 мг. Стеарат кальция или аэросил — 5 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника протеолитических и амилолитических ферментов, биологически активных метаболитов пробиотических микроорганизмов, содержащей цеолит. Бактистатин применяется в качестве средства, улучшающего функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, при: * дисбактериозах (дисбиозах) кишечника, возникающих в результате антибиотикотерапии, при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, после перенесенных кишечных инфекций, после лучевой и химиотерапии; * гастрите, гастродуодените; * хроническом панкреатите; * синдроме раздраженного кишечника; * диспепсии (тошнота, изжога, жидкий стул); * гиперхолестеринемии; * аллергических и дерматологических заболеваниях (аллергическом дерматите); * кишечных инфекциях; * воздействии неблагоприятных факторов для повышения неспецифической резистентности организма.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды, детям с 6 лет по 1 капсуле 2 раза в день. Продолжительность приема: Курс 1. Экспресс-курс поддержки микрофлоры. Длительность приема 5–7 дней. Рекомендуется: * для повышения неспецифической резистентности организма в периоды снижения иммунитета (весенне-осенний периоды, во время и после простудных заболеваний, при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды и пр.); * для повышения толерантности к физическим и психоэмоциональным нагрузкам; * профилактически при смене характера питания, приеме непривычной пищи в поездках. Курс 2. Курс биоочистки кишечника и реставрации микробиоценоза. Длительность приема 10–14 дней. Рекомендуется: * во время и после антибиотикотерапии; * при отравлениях; * при аллергических и дерматологических заболеваниях; * при наличии признаков легкой диспепсии (тошнота, изжога, жидкий стул); * во время диеты. Курс 3. Полный курс восстановления эндоэкологии кишечника и микробиоценоза. Длительность приема 20-25 дней. Рекомендуется: * при дисбактериозах (дисбиозах) различного происхождения, в том числе на фоне хронических заболеваний (гастрит, гастродуоденит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника); * во время и после длительных курсов антибиотикотерапии; * во время и после перенесенных кишечных инфекций; * при гиперхолестеринемии; * во время и после лучевой и химиотерапии.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте