Инструкция по применению
Бактисубтил Капсулы 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Патеон Франс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Порошок сухих бактерий Bacillus cereus
Количество в упаковке: 20



Действующее вещество

Порошок сухих бактерий Bacillus cereus

Состав

Действующее вещество: лиофильно высушенные споры Bacillus cereus IP 5832 - 35 мг;
Концентрация действующего вещества: лиофильно высушенные споры Bacillus cereus IP 5832 - 35 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Бактисубтил не предоставлены.

Показания

- острая и хроническая диарея различного генеза, особенно у детей (при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении переваривания пищи, аллергического генеза);- кишечный дисбактериоз (особенно вследствие лечения антибиотиками широкого спектра действия);- энтериты;- энтероколиты;- профилактика и лечение нарушений функции кишечника, спровоцированных химио- или радиотерапией;- в качестве вспомогательного средства при инфекционной диарее.

Способ применения и дозы

Устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания и независимо от возраста и массы тела пациента. При острых заболеваниях назначают по 1 капсуле 3-6 раз в сут; в тяжелых случаях доза может быть увеличена до ударной - 10 капсул в сут. При хронических заболеваниях назначают по 1 капсуле 2-3 раза в сут. Препарат следует принимать за 1 час до еды. Для применения препарата у грудных детей и детей до 3 лет, а также в случаях, когда у пациентов затруднено проглатывание капсулы, ее следует вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством сока, молока, воды.

Противопоказания

Заведомо известная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о безопасности применения препарата Бактисубтил при беременности не предоставлены.

Побочные действия

При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах Побочное действиене выявлено.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы. В случае значительного превышения дозы, даже без развития каких-либо симптомов или проявлений необходимо обратиться за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Пациент должен сообщать лечащему врачу о параллельно принимаемых лекарственных препаратах.

Особые указания

Препарат применяется по назначению врача. Пациенты не должны принимать препарат бесконтрольно или по совету третьих лиц.