Инструкция по применению
Бактоблис Дуо Таблетки для рассасывания 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Сербия по заказу Блюстоун Фарма (Швейцария)
Производитель: Bluestone Pharma GMbH
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пробиотические микроорганизмы: Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Витамин D3
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: Streptococcus salivarius K12 - 1x10^9 КОЕ, Lactobacillus rhamnosus LGG - 3x10^9 КОЕ, Витамин D3 - 5 мкг (200 МЕ)
Срок годности: 24

Описание

Входящие в состав компоненты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры ротовой полости и горла, повышению иммунитета, улучшению работы кишечника, нормализации баланса микрофлоры кишечника.

Действующее вещество

Пробиотические микроорганизмы: Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG, Витамин D3

Состав

Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG®, витамин D3 (содержит загуститель – гуммиарабик, носитель – орто-Фосфат кальция 3-замещенный, холекальциферол, антиокислитель – альфа-токоферол). Вспомогательные вещества: Фруктоза, мальтодекстрин, агенты антислеживающие: диоксид кремния аморфный, магниевая соль стеариновой кислоты, ароматизатор натуральный

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Способ применения и дозы

Детям старше 3х лет и взрослым 1 раз в день таблетку медленно рассасывать во рту до полного растворения. Прием желательно осуществлять в вечернее время после чистки зубов перед сном. После приема БАД не рекомендуется пить или принимать пищу в течение одного часа.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, под наблюдением врача лицам с нарушением иммунного статуса, при приёме иммунодепрессантов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим грудью женщинам принимать по согласованию и под наблюдением врача.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим грудью женщинам принимать по согласованию и под наблюдением врача.

Взаимодействие с другими препаратами

нет

Особые указания

20 дней. При необходимости прием можно повторить.

Условия хранения

В сухом и затемненном месте