Инструкция по применению
Бактробан Мазь для наружного применения 15 г 2%

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Великобритания
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мупироцин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 %

Описание

Мазь Бактробан 2% - антибиотик широкого спектра действия для наружного и местного применения. Мазь оказывает выраженный антибактериальный эффект, уничтожая прокариоты, с которыми не справляются другие антибиотики. Механизм действия препарата основан на блокаде синтеза белка в клетке прокариота за счет блокады фермента изолейцинтрансфер-РНК-синтетазы. Химическая природа антибиотика и уникальный фармакологический механизм действия позволяют не допускать перекрестной сопротивляемости с другими антибиотиками при точном соблюдении инструкции по применению.

Действующее вещество

Мупироцин

Состав

1 г мази содержит: мупироцин кальция 21.5 мг, что соответствует содержанию мупироцина 20 мг Вспомогательные вещества: парафин белый мягкий - 929.6 мг, софтизан 649 - 48.9 мг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

лечение первичных инфекций кожных покровов — импетиго, фолликулит, фурункулез (в т.ч. фурункул наружного слухового прохода и ушной раковины), эктима; вторичных инфекций кожных покровов — инфицированная экзема, инфицированные травмы (ссадины, укусы насекомых), незначительные (не требующие госпитализации) раны и ожоги; профилактика раневой инфекции после небольших порезов, ран и мелких ссадин.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь интраназальная: наносят на внутреннюю поверхность ноздрей 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Мазь для наружного применения: взрослым, детям и пациентам пожилого возраста небольшое количество наносят на пораженный участок кожи 2–3 раза в сутки, при необходимости накладывают асептическую повязку, курс лечения — до 10 дней. При печеночной недостаточности применяется стандартная дозировка. Нельзя сочетать мазь Бактробан с другими препаратами из-за риска ее разведения, снижения антибактериальной активности и стабильности.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому компоненту мази. С осторожностью: при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Использовать с осторожностью в связи с недостаточностью данных, подтверждающих безопасность применения препарата в эти периоды. Если Бактробан назначается для лечения трещины соска, то перед кормлением соски необходимо тщательно вымыть.

Особые указания

Мазь 2% наружную нельзя применять для лечения глазных заболеваний, интраназально, в области дренажа. Следует избегать попадания мази в глаза. В случае попадания глаза следует тщательно промыть водой до полного удаления остатков мази. Применение при почечной недостаточности: у пациентов пожилого возраста ограничений для использования нет, кроме тех случаев, когда во время лечения возникают условия для всасывания полиэтиленгликоля, входящего в состав мази, и признаков умеренной и тяжелой почечной недостаточности. Полиэтиленгликоль может всасываться через раневую поверхность или другие повреждения кожных покровов и экскретироваться через почки. Дерматологическую мазь (на основе полиэтиленгликоля) нельзя применять при состояниях, сопровождающихся повышенной абсорбцией полиэтиленгликоля, и особенно при умеренной или тяжелой почечной недостаточности. В редких случаях возникновения аллергических реакций или значительного раздражения кожных покровов, лечение следует прекратить, пораженный участок промыть водой для удаления остатков мази и назначить альтернативную противоинфекционную терапию. После нанесения на кожу следует тщательно вымыть руки. Длительное назначение мази Бактробан может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. Неблагоприятного влияния на способность управлять автомобилем/механизмами не наблюдалось.