Инструкция по применению
Баралгин® М таблетки 500мг №20

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 48



Описание

Баралгин® М таблетки – обезболивающий и жаропонижающий препарат для взрослых и детей старше 15 лет. Особенности и преимущества препарата Баралгин®: # Баралгин® таблетки обладают тройным действием: анальгетическим, жаропонижающим, спазмолитическим. # Может применяться при сильной головной и зубной боли, если не показаны другие методы лечения, а также при лихорадке, устойчивой к другим методам лечения. # Может работать до 10 часов. # Производится на европейском заводе с соблюдением требований GMP. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Баралгин® М (РУ П N011538/01) - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств.

Действующее вещество

Метамизол натрия

Состав

В 1 таб. #### Активное вещество #### Вспомогательные вещества:

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь гидролизуется в ЖКТ с образованием активного метаболита — 4-метиламиноантипирина (4-ММА), который абсорбируется в печени в 4-аминоантипирин (4-АА), а также фармакологически неактивные метаболиты. После приема внутрь 1 г метамизола 58% 4-ММА и 48% 4-АА связываются с белками плазмы крови. Эффективная терапевтическая концентрация в плазме 4-ММА достигается через 20–40 мин, Cmax — через 2 ч.

Показания

* Болевой синдром слабой и средней интенсивности (головная и зубная боль, невралгии, боли при радикулите, остеохондрозе, артрите, меналгии), * спазмы гладкой мускулатуры (почечная колика, желчная колика, кишечная колика), * лихорадочные состояния при инфекционно-воспалительных заболеваниях (в составе комбинированной терапии)

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым — по 500–1000 мг 4 раза в сутки. Максимальная разовая доза — 1 г, суточная — 3 г.

Противопоказания

* Гиперчувствительность к пиразолонам (в т.ч. метамизолизопропиламинофеназону, пропифеназону и феназонсодержащим средствам, фенилбутазону). * Острая печеночная порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в I и III триместрах беременности. Применение во II триместре — только по строгим медицинским показаниям. Кормление грудью противопоказано в течение 48 ч после приема Баралгина М

Побочные действия

* Агранулоцитоз, * лейкопения, * тромбоцитопения, * резкое падение АД, * преходящие нарушения функции почек (олигурия или анурия, протеинурия), * интерстициальный нефрит, * аллергические и иммунопатологические реакции (уртикарные высыпания на коже, конъюнктиве, слизистых оболочках в области носоглотки; синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, анафилактический шок)

Передозировка

В случае передозировки необходимо проконсультироваться с врачом. Возможно появление следующих симптомов: #### Лечение:

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает концентрацию цефалоспорина в крови, усиливает эффект алкоголя

Особые указания

Выведение с мочой одного из продуктов биотрансформации может вызывать красное окрашивание мочи (клинического значения не имеет и исчезает после отмены)

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении