Инструкция по применению
Барбовал Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Украина
Производитель: Фармак
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 80 г+17 г+18 г

Действующее вещество

Этилбромизовалерианат

Состав

100 мл капель содержат этилового эфира альфа-бромизовалериановой кислоты 1,8 г, валидола жидкого 8,01 г, фенобарбитала 1,7 г, натрия гидроксида 0,31 г, спирта ректифицированного 73 мл и воды очищенной до 100 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Неврозы Сопровождающиеся повышенной возбудимостью Бессонница Истерия Тахикардия Спазмы желудка и кишечника Метеоризм

Способ применения и дозы

Внутрь, за 20–30 мин до еды — по 10–25 капель Барбовал (с водой или на кусочке сахара) 2–3 раза в сутки в течение 10–15 дней. После 10–15 дней перерыва курс можно повторить.

Противопоказания

Не рекомендуется Барбовал применять детям, беременным женщинам и при кормлении грудью.

Особые указания

Наличие в составе лекарственного средства фенобарбитала может привести к риску развития синдрома Стивенса — Джонсона и Лайелла, что наиболее вероятно в первые недели лечения. Не рекомендуется длительное применение из-за опасности развития медикаментозной зависимости, возможного накопления брома в организме и развития отравления бромом. В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома. Следует осторожно назначать препарат при артериальной гипотензии, гиперкинезах, гипертиреозе, гипофункции надпочечников, острой и постоянной боли, острой интоксикации лекарственными средствами.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.