Инструкция по применению
Барсукор барсучий жир Капсулы 200 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Барсучий жир барсукор - это биологически активная добавка (БАД) к пище - натуральный продукт, топленный барсучий жир в капсулированном виде. Капсулированная форма Барсукор не имеет запаха и вкуса, что упрощает пероральный прием барсучьего жира. Он богат витаминами А, Е, омега-3 жирными кислотами. Барсучий жир обладает муколитическим действием, эффективен для профилактики (в комплексной терапии) воспалительных заболеваний дыхательных путей, оказывает общеукрепляющее действие.Активные ингредиентыБарсучий жир имеет прекрасный и сбалансированный набор важных витаминов и элементов, которые помогают заболевшему улучшить состояние, и способствую облегчению неприятных респираторных симптомов простуды. Барсучий жир включает в себя 4 важных компонента:Витамин А (223 мкг в 100 гр),Витамин Е (6.6 мг в 100 гр.),ПЖК (15.1 г в 100 гр), а именно: Линолевая 8.6 г. и Линоленовая 3.95 г. кислоты.Все эти компоненты прекрасно дополняют друг друга. Например, витамин А (ретинол) и витамин Е (токоферол) усиливают действия друг друга, а их совместное применение эффективнее раздельного. Токоферол также предупреждает окисление витамина А, улучшает его усваиваемость. В свою очередь Витамины А и Е являются антиоксидантами клеточных мембран, содержащих ПНЖК (P.Y. Byund, 1996)Витамин А. Используется как иммуномодулятор при вирусных заболеваниях и для лечения поражений кожи. При недостатке Витамина А поражается эпителий слизистой в т.ч. дыхательной системы, повышает восприимчивость к инфекциям Ретинол стимулирует иммунные процессы в организме, оказывает антивирусное действие, поддерживает нормальное состояние кож, слизистых оболочек, проявляет значительное антиоксидантное действие. Данный эффект достигается за счет того, что клеточный ретинолсвязывающий протеин проникает в клеточное ядро и стимулирует клеточные процессы.Витамин Е. Необходим в регуляции иммунной системы, в улучшении тканевого дыхания. Мегаважную роль витамин Е играет в качестве антиоксидантного средства. Задерживает окисление витамина А. Защищает ПНЖК от перикисного окисления и повреждения свободными радикалами, солями тяжелых металлов и т.д.. (Петров В.И. Спасов А.А. - Российская энциклопедия биологически активных добавок к пище/ российский научно-исследовательский институт здоровья 78-83)Линолевая кислота и Линоленовая кислота. Являются полиненасыщенными незаменимыми жирными кислотами. «Незаменимость» связана с тем, что они не вырабатываются в организме человека, но необходимы для жизнедеятельности. Источником этих кислот служат потребляемые продукты питания. Данные полиненасыщенные жирные кислоты являются структурными элементами клеточных мембран и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды-

Состав

«Жир барсучий топленый+» (жир-сырец барсука, подсолнечное масло, антиокислители аскорбилпальмитат, альфа токоферол, лецитин)Состав оболочки капсулы: вода дистиллированная, желирующий агент желатин, влагоустойчивый агент глицерин пищевой, консервант натрия бензонат.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот (в том числе ПНЖК Омега-3) и витамина Е Обладает муколитическим действием, эффективен для профилактики (в комплексной терапии) воспалительных заболеваний дыхательных путей, оказывает общеукрепляющее действие Рекомендуется применять для профилактики ОРВИ и гриппа. Сокращает продолжительность заболевания и способствует укреплению иммунитета Способствует снижению интенсивности инфекционно-воспалительного процесса

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет 12 капсул 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, заболевания печени и желчевыводящих путей в стадии обострения. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.