Инструкция по применению
Батрафен лак для ногтей 3г

Характеристики



Форма выпуска: Лак
Страна: Германия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Циклопирокс
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 80 мг/1 г

Действующее вещество

Циклопирокс

Состав

Циклопирокс 80 мг.Вспомогательные вещества: сополимер бутилгидромалеата и метоксиэтилена (раствор 50% в изопропаноле), этилацетат, изопропанол.

Форма выпуска

Лак

Фармакокинетика

Значения фунгицидных концентраций при однодневном применении превышают максимальную плазменную концентрацию в 20-30 раз (максимальная плазменная концентрация для дерматофитов, грибов рода кандида, плесневых и дрожжеподобных грибов - 0,98 - 3,9 мкг/мл, максимальная плазменная концентрация для микоплазмы и Trichomonasvaginalis - 7,8-31,3 мкг/мл).

Показания

- грибковые заболевания ногтей.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед первым нанесением препарата Батрафен, лак для ногтей, следует удалить ножницами максимально возможное количество пораженного ногтя и надпилить пилочкой оставшуюся ногтевую пластинку для создания неровной поверхности. Лак наносится тонким слоем на пораженный ноготь 1 раз через сутки в течение первого месяца, в течение второго - 2 раза в неделю, в течение третьего - 1 раз в неделю. Один раз в неделю (например, в воскресенье) лак удаляют с помощью обычного растворителя или после теплой ванночки соскабливают, при этом ножницами снова следует удалить подрастающую пораженную часть ногтевой пластины. Если лаковое покрытие повреждается в период между нанесениями лака, то следует наносить лак вновь только на те участки ногтя, где повреждено лаковое покрытие.Продолжительность лечения зависит от тяжести поражения грибком ногтевых пластинок, но период лечения не должен превышать 6 месяцев.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;- ввиду отсутствия клинического опыта применение препарата Батрафен, лак для ногтей, у детей до 10 лет, а также у женщин в период беременности и кормления грудью, не показано.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ввиду отсутствия клинического опыта применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано.

Побочные действия

Местные реакции (редко): зуд, жжение или раздражение кожи, гиперемия и шелушение кожи около пораженного ногтя; аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Особые указания

Для предотвращения высыхания лака следует плотно закрывать крышку после использования. Чтобы крышка не прилипала, избегать попадания лака на резьбу. После открытия флакона препарат можно использовать в течение 6 месяцев при соблюдении условий хранения.Во время лечения не рекомендуется использовать косметический лак для ногтей. При длительном наружном применении препарата возможны явления сенсибилизации.