Инструкция по применению
Бебинос капли для приема внутрь для детей 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: ДЕНТИНОКС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенхеля обыкновенного плоды
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 320 мг+200 мг+200 мг

Действующее вещество

Фенхеля обыкновенного плоды

Состав

Капли для приема внутрь в виде слегка опалесцирующей жидкости от коричневого до темно-коричневого цвета, с характерным запахом фенхеля. 1 г (24 капли) экстракт плодов фенхеля обыкновенного 320 мг экстракт цветков ромашки аптечной 200 мг экстракт плодов кориандра 200 мг Вспомогательные вещества: сорбитол, пропиленгликоль, натрия сахаринат.

Форма выпуска

Капли

Показания

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает ветрогонное и спазмолитическое действие. Предупреждает и устраняет желудочно-кишечные спазмы и боли, связанные с метеоризмом.

Побочные действия

В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента.

Особые указания

В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента.