Инструкция по применению
Бефунгин Раствор 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гриба березового экстракт+Кобальта хлорид
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Гриба березового экстракт+Кобальта хлорид

Состав

1 л содержит:Чаги 1000 гКобальта хлорида гексагидрата (кобальта хлористого 6-водного) 1,76 г Этанола (спирта этилового) 101,55 гВоды очищенной до получения 1 л препарата

Форма выпуска

Раствор

Показания

Бефунгин применяется в основном как симптоматическое средство при хронических гастритах, дискинезиях желудочно¬кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка, а также в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние онкологических больных.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь за 30 минут до еды. Перед употреблением содержимое флакона взбалтывают, разводят три чайные ложки препарата в 150 мл теплой кипяченой воды. Принима ют по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение 3 - 5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7-10 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Побочные действия

Аллергические реакции, при длительном приеме препарата возможны диспепсические явления.

Передозировка

Данные о передозировке препарата на людей отсутствуют. Специфический антидот неизвестен. Рекомендуется сделать промывание желудка, проводить поддерживающее симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием пенициллина и глюкозы

Особые указания

В период лечения рекомендуется преимущественно молочно-растительная пища, ограничение приема жиров и мяса, исключение копченостей, острых приправ и консервов.