Инструкция по применению
Белластезин Вифитех Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Анестезин (бензокаин) +Красавки экстракт густой
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 0.015 г+0.3 г

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Действующее вещество

Анестезин (бензокаин)+Красавки экстракт густой

Состав

На одну таблетку: Активные компоненты: Анестезин (бензокаин) 0,300 г Красавки экстракт густой 0,015 г Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая 0,035417 г Оксипропилцеллюлоза (гипролоза) 0,008510 г Кроскармеллоза натрия 0,003691 г Тальк 0,003691 г Кальция стеарат 0,003691 г Масса таблетки 0,370 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве симптоматического средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта сопровождающихся повышенной секреторной функцией желудка и спазмами гладкой мускулатуры с целью купирования болевого синдрома (гиперацидный гастрит язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки).

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день. Таблетку глотают не разжевывая и запивают водой. Курс лечения подбирают индивидуально. Если симптомы заболевания не проходят в течение 3-5 дней необходимо обратиться к врачу для решения вопроса о дальнейшем применении препарата.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата закрытоугольная глаукома гиперплазия предстательной железы детский возраст. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным следует применять только в случае когда по мнению врача польза для матери при применении лекарственного препарата превосходит потенциальный риск для плода. В случае применения женщинами кормящими грудью грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Возможны: сухость во рту потеря вкуса аппетита мидриаз (расширение зрачков) сонливость головокружение тахикардия нарушение речи возбуждение (особенно у пожилых пациентов) парез аккомодации аллергические реакции затруднение мочеиспускания запор. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат снижает антибактериальную активность сульфаниламидов. Амантадин и хинидин усиливают эффект препарата. При одновременном применении препарата с опиоидными анальгетиками и препаратами угнетающими центральную нервную систему возможно угнетение центральной нервной системы, с галоперидолом и органическими нитратами - повышается внутриглазное давление, с глюкокортикостероидами для системного применения - снижается их эффект и возможно повышение внутриглазного давления, с М-холиноблокаторами - усиливается антихолинергический эффект, с фуросемидом - возможна ортостатическая гипотензия. Резерпин ингибиторы моноаминоксидазы гуанетидин антацидные средства аскорбиновая кислота аттапульгит снижают эффект препарата. При одновременном применении препарата с антигистаминными препаратами усиливается антигистаминный эффект, с блокаторами бета-адренорецепторов - снижается их эффект, с гормональными контрацептивами - снижается контрацептивный эффект, с неселективными ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов - усиливается седативный эффект. Препарат снижает эффект нестероидных противовоспалительных препаратов гризеофульвина дигитоксина доксициклина кетоконазола метоклопрамида метронидазола, повышает эффект индапамида низатидина. При одновременном применении с препаратами содержащими калий возможно образование язв в кишечнике.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Следует избегать применения препарата лицам деятельность которых требует повышенной остроты зрения высокой концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций (управление автотранспортом работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора и т.п.).

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.