Инструкция по применению
Беллатаминал таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Белладонны алкалоиды+Фенобарбитал+Эрготамин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 0.0001 г+0.0200 г+0.0003 г
Срок годности: 60.0



Действующее вещество

Белладонны алкалоиды+Фенобарбитал+Эрготамин

Состав

Действующее вещество: Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин (Alcaloida Belladonnae+ Phenobarbitalum+ Ergotaminum)Концентрация действующего вещества (мг): Эрготамина тартрат (в пересчете на 100 %) - 0,0003 г

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Повышенная раздражительность, бессонница,вегето-сосудистая дистония, эмоциональная неустойчивость, связанная с половым созреванием, нарушением менструального цикла, климактерическим периодом;гипертиреоз, нейродермит и некоторые другие дерматозы,мигрень, психомоторное возбуждение.

Способ применения и дозы

Беллатаминал принимают внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день, после еды. Курс лечения индивидуален, обычно составляет несколько недель.

Противопоказания

Беременность, спазмы сосудов сердца, периферических сосудов, выраженные проявления атеросклероза, глаукома.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции, сухость во рту, сонливость, парез аккомодации.

Передозировка

Симптомы: головокружение, вялость, сонливость, тахикардия, расширение зрачков, нарушение аккомодации, затруднение мочеиспускания, атония кишечника, судороги, в тяжелых случаях - ступор, кома.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Действие препарата усиливают альфа- и бета-адреномиметики, никотин.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Условия хранения

В сухом месте