Инструкция по применению
Белый уголь Актив Таблетки массой 700 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10

Описание

Белый уголь® Актив – современный сорбент нового поколения, который способствует детоксикации, уменьшению проявлений воздействия патогенных микроорганизмов и аллергических реакций. Диоксид кремния связывает путем адсорбции и выводит из организма: токсины, поступающие извне (включая продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины, химические вещества), токсичные продукты, которые образуются в организме (в процессе распада белков в кишечнике), избыток желудочного сока и соляной кислоты, образующихся в желудке, и газов в кишечнике. Содействует выведению разнообразных токсичных продуктов, в том числе: алкалоидов, гликозидов, солей тяжелых металлов, фосфорорганических и хлорорганических соединений, барбитуратов, этилового спирта и продуктов его обмена, биологически активных веществ, связанных с процессами аллергии и воспаления (простагландинов, серотонина, гистамина), продуктов обмена белков (мочевины, креатинина, остаточного азота), липидов. Диоксид кремния содействует снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации (в первую очередь – печень и почки), коррекции процессов и иммунного статуса, улучшению показателей липидного обмена, таких, как уровень холестерина, триглицеридов и общих липидов. Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – это пищевые волокна, выделенные из растительной клетчатки. МКЦ нерастворима в воде и не подвергается расщеплению в пищеварительном тракте человека. МКЦ, как и другие пищевые волокна, действует на организм человека двумя путями: сорбционным и механическим. МКЦ сорбирует на своей поверхности и выводит из организма

тяжелые металлы, свободные радикалы, микробные токсины, продукты распада, а также связывает в желудке излишек желудочного сока и соляной кислоты, в кишечнике – желчные кислоты, билирубин, холестерин, снижая тем самым агрессивность желудочного сока и желчи. В тонком кишечнике МКЦ очищает механическим путем его слизистую оболочку, что ведет к улучшению пристеночного пищеварения и всасывающей функции кишечника. После приема МКЦ всасывание и усвоение пищи, лекарств, овощей и фруктов становится более полным. Раздражая рецепторы кишечника, МКЦ усиливает его перистальтику, за счет чего ликвидируется застой пищевого комка (химуса). Содержание активных веществ в 1 таблетке: Пищевые волокна - 208 мг - это 11 % от рекомендуемого уровня суточного потребления при употреблении 16 таблеток в день. Компоненты Белый уголь® Актив способствуют: уменьшению симптомов отравления различного генеза, уменьшению желудочно-кишечных проявлений различных заболеваний, включая аллергические реакции, очищению организма. Сорбенты могут использоваться для ослабления токсических и аллергических реакций, для восстановления проницаемости и целостности слизистых оболочек, улучшения состава кишечной микрофлоры, возможного снижения проявлений диспепсии (нормализуется стул, устраняется метеоризм). Энтеросорбция также используется в лечении заболеваний печени, когда снижается детоксикация как одна из функций печени. Прием комплекса Белый уголь® Актив способствует улучшению функционального состояния желудочно-кишечного тракта. Белый уголь® Актив – это: Высокий уровень площади сорбции (400 м2/г). Запатентованная технология производства, которая обеспечивает высокую скорость действия комплекса. Избирательность сорбции: не сорбирует полезные вещества и воду (не вызывает запоры). Таблетки цилиндрические двояковыпуклые белого цвета с гладкой ровной поверхностью, допустимо наличие мраморности и вкраплений. Запах слабый, специфический, характерный для используемого сырья.

Состав

1 таблетка содержит: Диоксид кремния аморфный – 210 мг; Микрокристаллическая целлюлоза – 208 мг; Наполнитель: декстроза – 157 мг; Разрыхлитель: кроскарамеллоза натрия – 97 мг; Антислеживающие агенты: тальк – 21 мг, стеарат магния – 7 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Белый уголь рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника пищевых волокон - энтеросорбентов для улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 3-4 таблетки 3-4 раза в сутки в промежутках между приемами пищи за 1 час до еды, запивать питьевой водой. Продолжительность приема от 1 до 5 дней, либо определяется врачом индивидуально.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период лактации, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочные и кишечные кровотечения, кишечная непроходимость, детский возраст до 14 лет.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.