Инструкция по применению
Бенфогамма Таблетки (драже) 150 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Германия
Производитель: Вёрваг
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бенфотиамин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 150 мг



Действующее вещество

Бенфотиамин

Состав

Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, блестящие, круглые, двояковыпуклые. 1 таб. бенфотиамин 150 мг Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 122 мг, повидон К30 - 8 мг, глицериды жирных кислот - 5 мг, кремния диоксид коллоидный - 7 мг, кармеллоза натрия - 3 мг, тальк - 10 мг. оболочки: шеллак - 3 мг, сахароза - 70.875 мг, кальция карбонат - 66.479 мг, тальк - 41.314 мг, акации камедь - 10.155 мг, крахмал кукурузный - 7.34 мг, титана диоксид - 10.932 мг, кремния диоксид коллоидный - 4.404 мг, повидон К30 - 6.21 мг, макрогол 6000 - 1.597 мг, глицерол 85% - 2.262 мг, полисорбат 80 - 0.133 мг, воск горный гликолиевый - 0.3 мг.

Форма выпуска

Драже

Показания

Дефицит витамина B1, подтвержденный клиническими и биохимическими исследованиями, развивающийся на фоне: — недостаточного и неполноценного питания (болезнь бери-бери) . — парентерального питания в течение длительного времени . — гемодиализа . — хронического алкоголизма (алкогольная кардиомиопатия, энцефалопатия Вернике, синдром Корсакова) . — повышенной потребности в витамине B1. Полиневропатии, обусловленные дефицитом витамина B1. Типичными признаками такого дефицита являются неврологические расстройства в виде невропатий с сенсорными нарушениями (боль, чувство покалывания, потеря чувствительности в верхних и нижних конечностях).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность является противопоказанием для применения препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции: ангионевротический отек, крапивница, кожный зуд.

Особые указания

Аллергические реакции: ангионевротический отек, крапивница, кожный зуд.