Инструкция по применению
Бензилбензоат Эмульсия 20 % 200 г

Характеристики



Форма выпуска: Эмульсия
Страна: Россия
Производитель: Ретиноиды
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бензилбензоат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 200 мг/1 г

Действующее вещество

Бензилбензоат

Состав

Эмульсия для наружного применения 20% 1 г бензил бензоат 200 мг

Форма выпуска

Эмульсия

Показания

Противопаразитарное средство для наружного применения. Активен в отношении чесоточных клещей, а также вшей. Под действием бензилбензоата гибель чесоточных клещей наступает через 7-32 мин, вшей - через 2-5 ч.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно: аллергические реакции.

Побочные действия

В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента.

Особые указания

В период лечения возможно обострение псориаза. При феохромоцитоме пропранолол можно применять только после приема альфа-адреноблокатора. После продолжительного курса лечения пропранолол следует отменять постепенно, под наблюдением врача. На фоне лечения пропранололом следует избегать в/в введения верапамила , дилтиазема . За несколько дней перед проведением наркоза необходимо прекратить прием пропранолола или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами У пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания, вопрос о применении пропранолола амбулаторно следует решать только после оценки индивидуальной реакции пациента.