Инструкция по применению
Бензилбензоат мазь для наружного применения 20% 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензилбензоат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20%

Описание

Мазь белого или желтовато-белого цвета, со специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха.

Действующее вещество

Бензилбензоат

Состав

Состав мази на 100 г: Действующее вещество: бензилбензоат 20,0 г Вспомогательные вещества: Триэтаноламин термостабильный (троламин) 5,0 г, стеариновая кислота 20,0 г, макрогол 400 5,0 г, вода очищенная до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

Показания

Чесотка. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно. Для лечения взрослых применяют 20% мазь. Курс лечения продолжается 4 дня. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Мазь наносят на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы, втирают руками, которые не моют до утра. На одно применение расходуется 30-40 г мази. На второй и третий день делают перерыв в лечении, при этом остатки мази с кожи не смывают. На четвертый день вечером больной моется с мылом и проводит втирание мази точно так же, как в первый день, используя оставшуюся мазь, и еще раз меняет белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов, в последующем их обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензилбензоату и другим компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение мази противопоказано.

Побочные действия

Местные реакции: возможно ощущение жжения, раздражение кожи, аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакологического взаимодействия мази с другими препаратами не выявлено. Бензилбензоат не рекомендуется применять одновременно с другими наружными лекарственными средствами.

Особые указания

Перед началом лечения больному целесообразно принять горячий душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также разрыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата). После каждого вынужденного мытья рук необходимо их обработать мазью вновь. Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения. Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности. Он исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами. После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время. Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности, белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из пользования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обрабатывать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств. Избегать попадания препарата в глаза, полость носа и полость рта. При попадании препарата в: полость носа - полость носа обильно промыть водой, полость рта - полость рта обильно прополоскать водой или 2%-ным теплым раствором натрия гидрокарбоната (питьевой соды), желудок - желудок промыть 1-2%-ным раствором натрия гидрокарбоната, водной смесью жженой магнезии и активированного угля (по 1-2 столовые ложки на стакан воды), глаза - глаза тщательно промыть водой или 1-2%-ным раствором натрия гидрокарбоната. Влияние на способность управлять трансп. Ср. И мех. : Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.