Инструкция по применению
Бензонал Таблетки 100 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бензобарбитал
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 48



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской.

Действующее вещество

Бензобарбитал

Состав

1 таблетка содержит: _Действующее вещество:_ Бензобарбитал (бензонал) – 100,000 мг; _Вспомогательные вещества:_ Крахмал кукурузный – 16,270 мг; кальция стеарат – 1,380 мг; полисорбат-80 – 0,354 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание Бензобарбитал быстро всасывается в желудке. Максимальная концентрация в крови достигается через 1–3 часа после приема. Устойчивая концентрация в крови устанавливается на 3 день. Терапевтическая концентрация в плазме крови 15–45 мг/л. Распределение Связь с белками плазмы – слабая. Равномерно распределяется в различных органах и тканях. Создает высокие концентрации в головном мозге, печени и почках. Проникает через гистогематические барьеры и в грудное молоко. Метаболизм Бензобарбитал в организме быстро метаболизируется микросомальными ферментами печени, высвобождая фенобарбитал, который оказывает противоэпилептический эффект. Выведение Период полувыведения (T1/2) – 3–4 дня. Выводится почками, как в неизмененном виде, так и в виде метаболитов.

Показания

Бензонал показан к применению у взрослых, детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет для лечения различных форм эпилепсии; лечения бессудорожных и полиморфных эпилептических приступов в комбинации с другими противоэпилептическими средствами.

Противопоказания

– Повышенная чувствительность к бензобарбиталу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; – тяжелые нарушения функции почек и/или печени; – хроническая сердечная недостаточность II–IV функционального класса по классификации New York Heart Association (NYHA) (декомпенсация сердечной деятельности); – сахарный диабет; – хронический алкоголизм, наркомания; – тяжелая миастения; – порфирия; – анемия; – бронхиальная астма; – дыхательная недостаточность; – гипертиреоз; – надпочечниковая недостаточность; – гиперкинезы; – депрессивные состояния, том числе с суицидальными попытками; – беременность и период грудного вскармливания; – детский возраст до 11 лет.

Взаимодействие с другими препаратами

Бензонал усиливает эффект наркотических анальгетиков, средств общей анестезии, нейролептиков, транквилизаторов, трициклических антидепрессантов, этанола, снотворных средств, снижает эффект парацетамола, антикоагулянтов, тетрациклинов, гризеофульвина, глюкокортикостероидных препаратов, минералокортикоидов, сердечных гликозидов, хинидина, витамина D, ксантинов. Препарат способен усиливать активность монооксигеназной ферментной системы печени, что следует учитывать при одновременном применении с другими препаратами из-за возможного снижения эффективности последних.

Условия хранения

Препарат подлежит предметно-количественному учету. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.