Инструкция по применению
Бензонал Таблетки 100 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бензобарбитал
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 48

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской.

Действующее вещество

Бензобарбитал

Состав

1 таблетка содержит: _Действующее вещество_: бензобарбитал (бензонал) - 100 мг. _Вспомогательные вещества_: крахмал картофельный, повидон К-90 (коллидон 90 F), карбоксиметилкрахмал натрия (примогель), кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро метаболизируется в организме, высвобождая фенобарбитал, который оказывает противоэпилептический эффект. Связь с белками плазмы - слабая. Создает высокие концентрации в мозге, печени и почках. Проникает через гистогематические барьеры и в грудное молоко. Период полувыведения - 3-4 дня. Выводится почками как в неизмененном виде, так и в виде метаболитов.

Показания

Эпилепсия различного генеза, генерализованные и парциальные припадки, эпилептический синдром.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелые паренхиматозные поражения печени, поражения почек с нарушением их функции, декомпенсация сердечной деятельности, сахарный диабет, депрессивные состояния, хронический алкоголизм, наркомания, тяжелая миастения, порфирия, анемия, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность, гипертиреоз, недостаточность надпочечников, гиперкинезия, депрессивные состояния с суицидальными попытками. Беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет.

Взаимодействие с другими препаратами

Бензонал усиливает эффект наркотических анальгетиков, лекарственных средств для общей анестезии, нейролептиков, транквилизаторов, трициклических антидепрессантов, этанола, снотворных лекарственных средств, снижает эффект парацетамола, антикоагулянтов, тетрациклинов, гризеофульвина, глюкокортикостероидов, минералокортикоидов, сердечных гликозидов, хинидина, витамина D, ксантинов. Препарат способен усиливать активность монооксигеназной ферментной системы печени, что следует учитывать при одновременном применении с другими препаратами из-за возможного снижения эффективности последних.

Условия хранения

Список сильнодействующих веществ. При температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.