# Инструкция по применению
# Бепантен Крем для наружного применения 5 % 100 г

## Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Германия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36




## Описание

Репарации тканей стимулятор.*Бепантен от компании Байер – лидер продаж в мире среди безрецептурных препаратов для лечения и ухода за кожей на основании глобальной базы данных DB6 по безрецептурным препаратам компании Nicholas Hall, 2017 г., евро.

## Действующее вещество

Декспантенол

## Состав

1 г крема содержит действующее вещество: декспантенол 50,0 мг, вспомогательные вещества: DL-пантолактон 5,0 мг, феноксиэтанол 5,0 мг, калия цетилфосфат (амфизол K) 12,7 мг, цетиловый спирт 24,0 мг, стеариловый спирт 16,0 мг, ланолин 13,0 мг, изопропилмиристат 35,0 мг, пропиленгликоль 15,0 мг, вода очищенная до 1000,0 мг.

## Форма выпуска

Крем

**Фармакокинетика**

При наружном применении быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

**Показания**

При нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.). Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов раз- личного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки). Для ухода за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы), для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, «пеленочный» дерматит).

**Способ применения и дозы**

Наружно. Крем наносят тонким слоем 1-2 раза в день на пораженную поверхность и слегка втирают. При уходе за молочной железой крем наносят на поверхность сосков после каждого кормления. При уходе за грудными детьми крем наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Бепантен® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

**Побочные действия**

Аллергические реакции возможны в крайне редких случаях.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Данных о взаимодействии препарата нет.

**Срок хранения после открытия**

30

**Условия хранения**

При комнатной температуре