Инструкция по применению
Бепантен Мазь для наружного применения 5 % 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 36



Описание

Регенерации тканей стимулятор.*Бепантен от компании Байер – лидер продаж в мире среди безрецептурных препаратов для лечения и ухода за кожей на основании глобальной базы данных DB6 по безрецептурным препаратам компании Nicholas Hall, 2017 г., евро.

Действующее вещество

Декспантенол

Состав

1 г мази содержит действующее вещество: декспантенол – 50 мг, вспомогательные вещества: протегин X 50 мг, цетиловый спирт 18 мг, стеариловый спирт 12 мг, воск пчелиный белый 40 мг, ланолин 250 мг, парафин мягкий белый 130 мг, масло миндальное 50 мг, парафин жидкий 150 мг, вода очищенная до 1000 мг.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При наружном применении быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

Показания

Профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов. Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и пеленочном дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации: лечение сухости сосков и болезненных трещин). Активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи 1-2 раза в день. Уход за молочными железами кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления. Уход за грудным ребенком: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Противопоказания

Бепантен® не следует применять при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Бепантен® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Побочные действия

Аллергические реакции (крапивница, зуд).

Передозировка

Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реакций. До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Случаи гипервитаминоза неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Особые указания

Избегайте попадания в глаза.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При комнатной температуре