Инструкция по применению
Береш плюс капли 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Венгрия
Производитель: Береш Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Состав

Капли для приема внутрь прозрачные, без осадка, светло-зеленого или желтоватого цвета. 1 мл (18 капель) железо (в форме сульфата) 2 мг цинк (в форме сульфата) 1.1 мг магний (в форме сульфата) 400 мкг марганец (в форме сульфата) 310 мкг медь (в форме сульфата) 250 мкг молибден (в форме аммония молибдената) 190 мкг ванадий (в форме аммония метаванадата) 120 мкг никель (в форме сульфата) 110 мкг бор (в форме борной кислоты) 100 мкг фтор (в форме натрия фторида) 90 мкг кобальт (в форме хлорида) 25 мкг Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, янтарная кислота, борная кислота, аминоуксусная кислота (глицин), натрия эдетат, глицерол, корректор кислотности (Е513), вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Показания

Заболевания и состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в микроэлементах или недостаточным поступлением с пищей: — неполноценное питание (в т.ч. при специальных диетах, сахарном диабете, вегетарианском питании) . — повышенная физическая нагрузка, интенсивные занятия спортом . — повышенная утомляемость, общая слабость, отсутствие аппетита, бессонница . — период реконвалесценции после инфекционно-воспалительных заболеваний, операций . — период менструаций.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата Капли Береш Плюс при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе. Возможно: аллергические реакции. Побочные эффекты возникают очень редко, в первую очередь, если капли принимаются натощак или с меньшим, чем рекомендовано, объемом жидкости.

Особые указания

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе. Возможно: аллергические реакции. Побочные эффекты возникают очень редко, в первую очередь, если капли принимаются натощак или с меньшим, чем рекомендовано, объемом жидкости.