Инструкция по применению
Беротек раствор для ингаляций 0,1% 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Италия
Производитель: Беринге р
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенотерол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг/1 мл



Действующее вещество

Фенотерол

Состав

Раствор для ингаляций прозрачный, бесцветный или почти бесцветный, свободный от частиц, с почти неощутимым запахом. 1 мл (20 капель) фенотерола гидробромид 1 мг Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0.1 мг, динатрия эдетата дигидрат - 0.5 мг, натрия хлорид - 8.6 мг, хлористоводородная кислота 1н (для доведения pH 3.2) - 0.946 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

— приступы бронхиальной астмы или другие состояния с обратимой обструкцией дыхательных путей (в т.ч. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких) . — профилактика приступов бронхиальной астмы вследствие физического напряжения . — в качестве бронхорасширяющего средства перед ингаляцией других лекарственных препаратов (антибиотиков, муколитиков, ГКС) . — проведение бронхорасширяющих тестов при исследовании функции внешнего дыхания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Результаты доклинических исследований в сочетании с имеющимся опытом клинического применения препарата Беротек . свидетельствуют о том, что он не вызывает никаких нежелательных явлений при беременности. Тем не менее, следует с осторожностью применять препарат при беременности, особенно в I триместре, в том случае, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Следует учитывать возможность ингибирующего эффекта фенотерола на сократительную активность матки. Доклинические исследования показали, что фенотерол проникает в грудное молоко. Безопасность применения препарата в период лактации не изучена. В период лактации применение препарата возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

Как и все другие виды ингаляционного лечения, препарат Беротек . может вызывать симптомы местного раздражающего действия. Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, аритмия, тахикардия, сердцебиение, повышение систолического АД, снижение диастолического АД. Со стороны обмена веществ: гипокалиемия, включая тяжелую гипокалиемию. Со стороны нервной системы: возбуждение, нервозность, тремор, головная боль, головокружение. Со стороны дыхательной системы: кашель, раздражение гортани и глотки, парадоксальный бронхоспазм. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Со стороны кожных покровов: гипергидроз, кожные реакции (сыпь, зуд, крапивница). Со стороны костно-мышечной системы: спазм мышц, миалгия, мышечная слабость.

Особые указания

Как и все другие виды ингаляционного лечения, препарат Беротек . может вызывать симптомы местного раздражающего действия. Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, аритмия, тахикардия, сердцебиение, повышение систолического АД, снижение диастолического АД. Со стороны обмена веществ: гипокалиемия, включая тяжелую гипокалиемию. Со стороны нервной системы: возбуждение, нервозность, тремор, головная боль, головокружение. Со стороны дыхательной системы: кашель, раздражение гортани и глотки, парадоксальный бронхоспазм. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Со стороны кожных покровов: гипергидроз, кожные реакции (сыпь, зуд, крапивница). Со стороны костно-мышечной системы: спазм мышц, миалгия, мышечная слабость.