
Инструкция по применению
Бесалол Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг +300 мг



Описание

Круглые таблетки от светло-желтого до светло- коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат

Состав

Состав на 1 таблетку:Действующие вещества:Фенилсалицилат - 300 мгБелладонны листьев экстракт (красавки экстракт густой) - 10 мгВспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ-101)Повидон К-25 (коллидон 25) Карбоксиметилкрахмал натрия (примогель)Магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости с дисбактериозом кишечника.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи, желудочно-кишечное кровотечение, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности применение препарата оправдано, если потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Повышение внутриглазного давления, сухость слизистой оболочки полости рта, запоры, мидриаз, парез аккомодации, головокружение, задержка мочи, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: психомоторное возбуждение, паралич аккомодации, острая задержка мочи. Рекомендации: прекратить применение препарата, обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.Хранить в недоступном для детей месте.