Инструкция по применению
Бесалол таблетки 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Украина
Производитель: Здоровье
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 10 мг +300 мг

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, светло-коричневого цвета с сероватым или зеленоватым оттенком, с вкраплениями, со слабым специфическим запахом, с фаской и риской.

Действующее вещество

Белладонны листьев экстракт+Фенилсалицилат

Состав

1 таблетка содержит: активные вещества: красавки экстракт густой (белладонны листьев экстракт густой) - 10 мг, фенилсалицилат - 300 мг, вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 28,992 мг, тальк - 10,32 мг, кислота стеариновая - 0,688 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика экстракта листьев белладонны не изучена. Фенилсалицилат. При приеме внутрь не подвергается воздействию кислой среды желудочного сока гидролизуется в щелочной среде кишечника до фенола и салициловой кислоты. Фенол выводится почками создавая высокие концентрации в мочевыводящих путях. Салициловая кислота метаболизируется преимущественно в печени с образованием 4-х метаболитов обнаруживаемых во многих тканях и моче. Выводится преимущественно путем активной секреции в канальцах почек в виде собственно салициловой кислоты (60%) и ее метаболитов. Выведение неизмененного салицилата зависит от pH мочи (при защелачивании мочи возрастает ионизация салицилатов ухудшается их реабсорбция и значительно увеличивается выведение). Скорость выведения зависит от дозы: при приеме небольших доз период полувыведения - 2-3 ч с увеличением дозы может возрастать до 15-30 ч.

Показания

Заболевания желудочно-кишечного тракта сопровождающиеся спазмами гладкой мускулатуры органов брюшной полости и дисбактериозом кишечника.

Способ применения и дозы

Назначают взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 6 таблеток. Дозы и длительность применения устанавливаются индивидуально и зависят от течения заболевания его тяжести клинической эффективности препарата и характера терапии (прием препарата самостоятельно или в комплексе с другими лекарственными средствами). Максимальная длительность лечения - 7 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата закрытоугольная глаукома гиперплазия предстательной железы желудочно-кишечное кровотечение хроническая почечная недостаточность детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата в период беременности не установлена поэтому применение препарата в период беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить кормление грудью.

Побочные действия

Побочные эффектны обусловленные м-холиноблокирующим действием: сухость слизистой оболочки полости рта мидриаз парез аккомодации атония кишечника головокружение тахикардия задержка мочи гиперемия кожи век фотофобия. Аллергические реакции: кожная сыпь.

Передозировка

Симптомы: нарушение аккомодации мидриаз повышение внутриглазного давления затрудненное мочеиспускание (в т.ч. острая задержка мочи) атония кишечника дисфагия жажда сухость кожных покровов и слизистых оболочек тахикардия головная боль головокружение психомоторное возбуждение делирий судороги. Лечение: отмена препарата. Терапия симптоматическая. Антидотами являются ингибиторы холинэстеразы например неостигмина метилсульфат или физостигмин.

Взаимодействие с другими препаратами

Другие лекарственные препараты обладающие м-холиноблокирующим действием усиливают фармакологические эффекты экстракта листьев красавки. Ингибиторы холинэстеразы и м-холиномиметики ослабляют действие экстракта листьев красавки. Угнетение перистальтики кишечника под влиянием экстракта листьев красавки может привести к изменению всасывания других лекарственных средств. Одновременное применение антацидов и противодиарейных препаратов может привести к снижению абсорбции действующих веществ лекарственного препарата Бесалол.

Особые указания

Лицам деятельность которых требует повышенной остроты зрения следует избегать применения препарата. Возможно применение препарата под контролем врача при заболеваниях сердечно-сосудистой системы сопровождающихся брадикардией. Алкалоиды экстракта листьев белладонны могут влиять на результаты таких лабораторных тестов: тест на определение кислотности желудка, исследование опорожнения желудка.

Срок хранения после открытия

4 года. Не использовать по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.