Инструкция по применению
Бетадин Мазь для наружного применения 10% 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Венгрия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-йод
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Бетадин 10 мазь - это лекарственное средство, которое применяется для лечения различных заболеваний кожи. Она содержит в своем составе активное вещество - повидон йод, который обладает антисептическим и антибактериальным действием. Благодаря этому Бетадин эффективно борется с инфекционными возбудителями, препятствуя их дальнейшему размножению и распространению. Мазь может применяться для лечения бактериальных и грибковых инфекций кожи , ожогов, пролежней, ссадин, раны и др. Она обладает быстрым и продолжительным действием, но может вызвать раздражение и аллергические реакции.

Действующее вещество

Повидон-йод

Состав

В 1 г мази содержится 100 мг действующего вещества – повидона йода (что соответствует 10,25 мг активного йода), а также вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, макрогол 400, макрогол 4000, макрогол 1000, макрогол 1500, вода очищенная.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении почти не происходит реабсорбции йода.

Показания

Бактериальные и грибковые инфекции кожи, ожоги, трофические язвы, пролежни, инфекционные дерматиты, ссадины, раны.

Способ применения и дозы

Наружно, на пораженную поверхность мазь наносят тонким слоем 2-3 раза в сутки, можно использовать под окклюзионные повязки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду и другим составляющим препарата, \-нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз) (см.раздел «Особые указания»), \-аденома щитовидной железы, \-герпетиформный дерматит Дюринга, \-одновременное применение радиоактивного йода, \-недоношенные и новорожденные дети (см.раздел «Особые указания»).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Бетадина не рекомендуется с 3-го месяца беременности и во время лактации. При необходимости в этих случаях лечение возможно под индивидуальным медицинским контролем.

Побочные действия

При частом применении на большой площади раненой поверхности и слизистых оболочках, может произойти системная реабсорбция йода, что может отразиться на тестах функциональной активности щитовидной железы. Реакции повышенной чувствительности к препарату, возможно проявление аллергической реакции (гиперемия, жжение, зуд, отек, боль), что требует отмены препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, особенно содержащими щелочи, ферменты и ртуть. При присутствии крови бактерицидное действие может уменьшаться, однако при увеличении концентрации препарата, бактерицидная активность может быть увеличена.

Особые указания

При нарушениях функции щитовидной железы применение препарата возможно только под строгим наблюдением врача. Применение препарата у новорожденных детей возможно только в случае необходимости, после исследования функции щитовидной железы. Следует соблюдать осторожность при регулярном применении на поврежденной коже у больных с хронической почечной недостаточностью. В месте применения образуется окрашенная пленка, сохраняющаяся до высвобождения всего количества активного йода, её исчезновение означает прекращение действия препарата. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. Не использовать при укусах насекомых, домашних и диких животных. Избегать попадания препарата в глаза.

Условия хранения

Беречь от детей