Инструкция по применению
Бетадин Раствор для местного и наружного применения 100 мг/мл 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Венгрия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-йод
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%
Срок годности: 36

Описание

Раствор темно-коричневого цвета с запахом йода.

Действующее вещество

Повидон-йод

Состав

1 мл раствора содержит 100 мг повидон-йода (что соответствует 10 мг активного йода), вспомогательные вещества: глицерол, ноноксинол 9, лимонная кислота, безводная, натрия гидрофосфат (динатрия гидрофосфат), натрия гидроксид, вода очищенная.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При местном применении почти не происходит реабсорбции йода.

Показания

• Лечение и профилактика раневых инфекций в хирургии, травматологии, комбустиологии, стоматологии • Лечение бактериальных, грибковых и вирусных инфекций кожи, профилактика суперинфекции в дерматологической практике • Обработка пролежней, трофических язв, диабетической стопы • Дезинфекция кожи и слизистых пациентов при подготовке к оперативным вмешательствами, инвазивным исследованиям (пункции, биопсии, инъекции и т.д.) • Дезинфекция кожи вокруг дренажей, катетеров, зондов • Дезинфекция полости рта при стоматологических операциях • Дезинфекция родовых путей, при проведении «малых» гинекологических операций (искусственное прерывание беременности, введение внутриматочной спирали (ВМС), коагуляция эрозии и полипа и т.д.)

Способ применения и дозы

Для обработки кожи и слизистых применяют в неразбавленном виде для смазывания, промывания или в качестве влажного компресса. Для применения в дренажных системах 10% раствор разбавляют от 10 до 100 раз. Раствор приготавливают непосредственно перед применением, разбавленные растворы не хранят.

Противопоказания

• повышенная чувствительность к йоду и другим составляющим препарата, • нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз) (см.раздел «Особые указания»), • аденома щитовидной железы, • герпетиформный дерматит Дюринга, • одновременное применение радиоактивного йода, • недоношенные и новорожденные дети.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Бетадина не рекомендуется с 3-го месяца беременности и во время лактации. При необходимости в этих случаях лечение возможно под индивидуальным медицинским контролем.

Побочные действия

При частом применении на большой площади раненой поверхности и слизистых оболочках, может произойти системная реабсорбция йода, что может отразиться на тестах функциональной активности щитовидной железы. Реакции повышенной чувствительности к препарату, возможно проявление аллергической реакции (гиперемия, жжение, зуд, отек, боль), что требует отмены препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, особенно содержащими щелочи, ферменты и ртуть. В присутствии крови бактерицидное действие может уменьшаться, однако при увеличении концентрации раствора, бактерицидная активность может быть увеличена.

Особые указания

При нарушениях функции щитовидной железы применение препарата возможно только под строгим наблюдением врача. Применение препарата у новорожденных детей возможно только в случае необходимости, после исследования функции щитовидной железы. Следует соблюдать осторожность при регулярном применении на поврежденной коже у больных с хронической почечной недостаточностью. Необходимо следить за тем, чтобы под больным не оставался излишек раствора. Не нагревать перед употреблением. В месте применения образуется окрашенная пленка, сохраняющаяся до высвобождения всего количества активного йода, что означает прекращение действия препарата. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. Не использовать при укусах насекомых, домашних и диких животных.

Условия хранения

Беречь от детей