Инструкция по применению
Бетасерк Таблетки 24 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 24 мг
Срок годности: 60.0



Описание

Действующим веществом препарата Бетасерк® является бетагистина дигидрохлорид, который относится к группе препаратов для лечения головокружения.

Действующее вещество

Бетагистин

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Бетасерк® применяется у взрослых в возрасте от 18 лет• при синдроме Меньера, характеризующимся следующими основными симптомами:– головокружение (сопровождающееся тошнотой/рвотой);– снижение слуха (тугоухость); – шум в ушах.• для симптоматического лечения вестибулярного головокружения (вертиго).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.Рекомендуемая дозаЛечащий врач подберет необходимую Вам дозу препарата Бетасерк® в зависимости от Вашей реакции на лечение.Максимальная суточная доза препарата для взрослых составляет 48 мг бетагистина в день.Препарат Бетасерк®, 24 мг следует принимать по 1 таблетке 2 раза в день.Путь и (или) способ введенияПрепарат необходимо принимать внутрь, запивая водой.Линия разлома (риска) на таблетках препарата Бетасерк®, 24 мг предназначена только для разламывания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком. Поместите таблетку на твердую поверхность риской вверх и надавите на нее большим пальцем. Продолжительность терапииПринимайте препарат Бетасерк® так долго, как советует Ваш врач. Улучшение иногда наблюдается только после нескольких недель лечения. В некоторых случаях наилучшие результаты достигаются после нескольких месяцев лечения.Если Вы приняли препарата Бетасерк® больше, чем следовалоЕсли Вы приняли больше препарата, чем следовало, немедленно сообщите об этом лечащему врачу.Вы можете почувствовать тошноту, сонливость, боль в животе, судороги. Если Вы забыли принять препарат Бетасерк®Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Если Вы забыли принять препарат в нужное время, следуйте своему обычному графику дозирования, приняв следующую дозу в назначенное время.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Бетасерк®:• если у Вас аллергия на бетагистина дигидрохлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);• если у Вас феохромоцитома (опухоль надпочечников, при которой может повышаться артериальное давление);• если Вы младше 18 лет.Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.БеременностьДанные о применении препарата Бетасерк® у беременных женщин отсутствуют. Ввиду возможного неблагоприятного воздействия препарата Бетасерк® на плод не принимайте препарат Бетасерк® во время беременности. Грудное вскармливаниеНеизвестно, выделяется ли бетагистин в грудное молоко. Ввиду возможного неблагоприятного воздействия препарата Бетасерк® на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не принимайте препарат Бетасерк® в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Бетасерк® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Некоторые нежелательные реакции могут быть очень серьезными и опасными для жизни – они перечислены ниже. Если у Вас возникла какая-либо из этих реакций, прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью.• предобморочное состояние или потеря сознания, резкое снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (анафилактическая реакция)• отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек);• зуд, сыпь, зудящие волдыри на коже (крапивница) (признаки аллергической реакции);• сильная аллергическая реакция (сыпь, зуд, отек лица, губ, рта или горла, которые могут вызвать затруднения при глотании или дыхании).Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Бетасерк®Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): • тошнота;• расстройство пищеварения (диспепсия);• головная боль.Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):• умеренно выраженные расстройства со стороны органов пищеварения, такие как рвота, желудочно-кишечные боли, вздутие живота. Эти эффекты обычно исчезают после приема препарата одновременно с пищей или после снижения дозы.Сообщение о нежелательных реакциях

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Некоторые лекарственные препараты могут влиять на эффективность препарата Бетасерк®.В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете:• антигистаминные средства, используемые для лечения аллергии;• лекарственные препараты, называемые ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), например селегилин.

Особые указания

Перед приемом препарата Бетасерк® проконсультируйтесь с лечащим врачом.Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом лечащему врачу до начала приема препарата Бетасерк®:• у Вас бронхиальная астма;• у Вас язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки.При наличии у Вас какого-либо из перечисленных заболеваний Вы будете находиться под наблюдением лечащего врача во время лечения препаратом Бетасерк®.Если Вы не уверены, относится ли что-то из перечисленного к Вам, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом прежде, чем начнете принимать препарат Бетасерк®.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении