Инструкция по применению
Бетавер таблетки 24 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бетагистин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 24 мг
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Бетагистин

Состав

Бетагистина дигидрохлорид 24 мг;Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза (сахар молочный), крахмал кукурузный, поливинилпирролидон (повидон), карбоксиметилкрахмал натрия (примогель), тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь бетагистина дигидрохлорид быстро и практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Связывание с белками плазмы низкое.;Практически полностью выводится из организма с мочой в течение 24 ч. T1/2 - 3-4 ч.

Показания

Болезнь Меньера; синдромы, характеризующиеся головокружением, шумом в ушах и /или прогрессирующей потерей слуха, в т.ч. водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные нарушения (включая головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота, снижение слуха), вестибулярный неврит, лабиринтит, доброкачественное позиционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций); вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Разовая доза - 8-16 мг, кратность приема - 3 раза/сут. Лечение проводят длительно.

Противопоказания

Феохромоцитома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, бронхиальная астма, I триместр беременности, повышенная чувствительность к бетагистину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение в I триместре беременности и в период лактации. С осторожностью следует применять во II и III триместрах беременности.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: возможны незначительно выраженные тошнота, чувство тяжести в эпигастрии.;Аллергические реакции: в отдельных случаях - кожная сыпь, зуд, крапивница.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота; при приеме в дозе свыше 640 мг возможно появление судорог.;Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Антигистаминные препараты при одновременном приеме снижают эффект бетагистина.

Особые указания

С осторожностью следует применять у пациентов с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, во II и III триместрах беременности, а также у детей.;Необходимо учитывать, что желаемый клинический эффект достигается после нескольких месяцев лечения.;При диспептических симптомах бетагистин рекомендуется принимать во время или после еды.

Условия хранения

В сухом месте