Инструкция по применению
Безак таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бипериден
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бипериден

Состав

Биперидена гидрохлорид 2 мг;Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 192 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 5 мг, магния стеарат - 1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь Cmax составляет 1.01-6.53 нг/мл и достигается в течение – 0.5-2 ч. Css при приеме 2 мг 2 раза/сут достигается через 15.7-40.7 ч. Связывание с белками плазмы составляет 91-94%. Биодоступность при приеме внутрь – 33%. Плазменный клиренс - 11.6 мл/мин/кг. Полностью метаболизируется. Основные метаболиты – бициклогептан и пиперидин. Выведение осуществляется в две фазы с T1/2 1.5 ч - в первую фазу и 24 ч – во вторую. Выводится почками и через кишечник. Выделяется с грудным молоком.

Показания

Болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма (в составе комбинированной терапии), экстрапирамидные нарушения, вызванные антипсихотическими средствами (нейролептиками).

Способ применения и дозы

Взрослым при приеме внутрь в начале лечения - по 1 мг 2 раза/сут, затем частоту приема можно постепенно увеличить и применять по 2 мг 2-4 раза/сут. Доза может быть повышена до 6-16 мг/сут. При в/м или в/в введении разовая доза составляет 2.5-5 мг. Повторное введение в той же дозе возможно каждые 30 мин, но не более 4 раз /сут.;Максимальные дозы: при приеме внутрь - 16 мг/сут; при парентеральном введении - 20 мг/сут.

Противопоказания

Закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, обструктивные состояния ЖКТ (в т.ч. стеноз привратника, паралитическая кишечная непроходимость), мегаколон; повышенная чувствительность к биперидену.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение биперидена при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по строгим показаниям. Бипериден выделяется с грудным молоком, поэтому на период лечения грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Побочные действия

Со стороны ЦНС: слабость, астения, головокружение, оцепенение, беспокойство, нарушение памяти, спутанность сознания, галлюцинации.;Со стороны органа зрения: мидриаз, нарушение аккомодации.;Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; редко - брадикардия; при парентеральном введении - снижение АД.;Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, диспепсия, запоры.;Со стороны обмена веществ: уменьшение потоотделения.;Со стороны мочевыделительной системы: у пациентов с гипертрофией предстательной железы - затруднение мочеиспускания.;Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с антихолинергическими препаратами возможно усиление центральных и периферических антихолинергических эффектов.;При одновременном применении с антипсихотическими средствами (нейролептиками) повышается риск развития поздней дискинезии.;При одновременном применении с бипериденом усиливается действие блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов и противосудорожных средств.;При одновременном применении с леводопой возможно усиление м-холиноблокирующего действия и дискинезии.;При одновременном применении бипериден уменьшает эффективность метоклопрамида.; При одновременном применении с хинидином повышается риск развития дискинезии. Потенцирует действие этанола.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с эпилепсией, аритмией, у больных пожилого возраста.;Возможно развитие лекарственной зависимости.;Лечение следует прекращать постепенно из-за риска развития абстиненции.;Безопасность применения бипериден у детей не установлена, поэтому применение не рекомендуется.;В период лечения не допускать употребления алкоголя.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;С осторожностью применять у пациентов, деятельность которых требует повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте