Инструкция по применению
Бициклол Таблетки 25 мг 18 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Beijing Union Pharmaceutical Factory
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бициклол
Количество в упаковке: 18

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Бициклол

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: Вспомогательные вещества:

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат быстро всасывается после перорального приёма и определяется в крови через 15 мин. Фармакокинетические параметры: Особенности фармакокинетики: Метаболизм и выведение:

Показания

Показания к применению: у пациентов со следующими особенностями:

Способ применения и дозы

Внутрь. Дозировка: по 25–50 мг 3 раза в день после еды. Курс лечения: 12 недель. По рекомендации врача курс лечения (с использованием дозы 25 мг 3 раза в день) может быть продлён до 6 месяцев.

Противопоказания

Противопоказания к применению препарата:

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении Бициклола у беременных и кормящих женщин отсутствуют. Применение препарата при беременности противопоказано. Неизвестно, выделяется ли препарат в грудное молоко. В случае необходимости применения препарата Бициклол в период лактации необходимо прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Препарат Бициклол обычно хорошо переносится нежелательные явления обычно носят преходящий характер, выражены в лёгкой или средней степени тяжести и купируются самостоятельно после отмены препарата или с помощью симптоматической терапии. Со стороны нервной системы: Со стороны желудочно-кишечного тракта: Со стороны системы кожи и подкожно-жировой клетчатки: Лабораторные данные:

Передозировка

Случаев передозировки препарата Бициклол не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие препарата Бициклол с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

В период лечения необходимо проводить периодический контроль показателей функции печени и клинической картины заболевания согласно стандартам ведения соответствующей патологии. У пациентов с наличием сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, холецистит, панкреатит, приём препарата Бициклол может сопровождаться клинически значимым повышением активности АСТ, ЩФ и ГГТП. В связи с этим терапию таких пациентов препаратом Бициклол следует проводить с осторожностью под дополнительным контролем функциональных показателей гепатобилиарной системы. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Исследований препарата Бициклол на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводилось. В период лечения препаратом Бициклол следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, в связи с возможностью развития головокружения.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищённом от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.