Инструкция по применению
Бифиформ Капсулы кишечнорастворимые 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Дания
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24



Описание

Бифиформ — полезные бактерии для поддержки иммунитета.Бифиформ капсулы кишечнорастворимые 30 шт — препарат для восстановления микрофлоры кишечника. Пробиотик направленного действия: нормализует микрофлору кишечника, используется в лечении и профилактике дисбактериозов и антибиотик-ассоциированной диареи, поддерживает иммунную систему1-2. В комплексной терапии пробиотики Бифиформ оказывают положительное действие в борьбе с острыми кишечными инфекциями. • Бифиформ способствует восстановлению микрофлоры кишечника после приема антибиотиков2. • В состав2 препарата входят изученные, безопасные и полезные пробиотические бактерии. • Кишечнорастворимая капсула Бифиформ имеет двухслойную защитную оболочку — бактерии сохраняют свои полезные свойства, попадая в кишечник2. • Не содержит лактозы2. Препарат Бифиформ кишечнорастворимые капсулы доступен в удобных форматах: в упаковках 15 и 30 штук. 1. Действующие вещества: бифидобактерии лонгум + энтерококкус фэциум. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Бифиформ Номер РУ П N013677/01.

Действующее вещество

Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум

Состав

Действующие компоненты: Бифидобактерии (Bifidobacterium longum), Энтерококки (Enterococcus faecium). Концентрации действующих компонентов (ед.): Бифидобактерии - 10# КОЕ, Энтерококки - 10# КОЕ.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Бифиформ - препарат для лечения и профилактики дисбактериозов различной этиологии. Входящие в состав препарата молочнокислые бактерии поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры.

Показания

Диарея, вызванная острым и обострением хронического гастроэнтерита, ротавирусной инфекцией. антибиотик-ассоциированная диарея. диарея путешественника. в комплексной терапии острых кишечных инфекций. в комплексной терапии хронических заболеваний ЖКТ, таких как колит, синдром раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных расстройств функционального генеза. нормализация микрофлоры кишечника, лечение и профилактика дисбактериозов и поддержание иммунной системы у детей старше 2-х лет и взрослых. непереносимость лактозы. в составе комплексной стандартной эрадикационной терапии у пациентов с хеликобактерной инфекцией.

Способ применения и дозы

При острой диарее препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2-3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов. Для нормализации микрофлоры кишечника и поддержки иммунной системы препарат назначаютв дозе 2-3 капсулы в сутки 10-21 день. Пациентам с непереносимостью лактозы рекомендуется принимать препарат по 1 капсуле 3 раза в сутки. При проведении эрадикационной терапии Бифиформ назначают по 2 капсулы 2 раза в день на протяжении двух недель с первого дня эрадикационной терапии. Детям с 2-х лет по 1 капсуле 2-3 раза в день. Если ребенок не может проглотить капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое с небольшим количеством жидкости.

Противопоказания

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Бифиформ в период беременности и лактации считается безопасным, поскольку препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах по установленным показаниям побочные эффекты не выявлены.

Передозировка

Симптомы передозировки ранее не зарегистрированы. В случае значительного превышения рекомендуемых доз целесообразно медицинское наблюдение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными препаратами. Разрешается одновременное назначение с антибиотиками.

Особые указания

Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. Меры предосторожности: не следует превышать максимальную суточную дозу.

Условия хранения

В сухом месте