Инструкция по применению
Бифиформ Капсулы кишечнорастворимые 15 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум
Количество в упаковке: 15



Описание

Бифиформ — полезные бактерии для поддержки иммунитетаБифиформ капсулы кишечнорастворимые 15 шт — препарат для восстановления микрофлоры кишечника. Пробиотик направленного действия: нормализует микрофлору кишечника, используется в лечении и профилактике дисбактериозов и антибиотик-ассоциированной диареи, поддерживает иммунную систему1-2. В комплексной терапии пробиотики Бифиформ оказывают положительное действие в борьбе с острыми кишечными инфекциями. • Бифиформ способствует восстановлению микрофлоры кишечника после приема антибиотиков2. • В состав препарата входят изученные, безопасные и полезные пробиотические бактерии2. • Кишечнорастворимая капсула Бифиформ имеет двухслойную защитную оболочку — бактерии сохраняют свои полезные свойства, попадая в кишечник2. • Не содержит лактозы2. Препарат Бифиформ кишечнорастворимые капсулы доступен в удобных форматах: в упаковках 15 и 30 штук. 1. Действующие вещества: бифидобактерии лонгум + энтерококкус фэциум. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Бифиформ Номер РУ П N013677/01.

Действующее вещество

Бифидобактерии лонгум+Энтерококкус фециум

Состав

1 капсула кишечнорастворимая содержит: Действующие вещества: Enterococcus faecium ENCfa-68 - не менее 1 х 107 КОЕ, Bifidobacterium longum BB-46 - не менее 1 х 107 КОЕ. Вспомогательные вещества: декстроза безводная - 162,5 мг, закваска дрожжевая* - 17,5 мг, рожкового дерева бобов камедь - 12,5 мг, лактулоза - 0,5 мг, магния стеарат - 2,5 мг. Состав капсульнои оболочки**: желатин - 48,0 мг, титана диоксид - (0,96 мг)***, магния стеарат - 0,5 мг, метакриловой кислоты и метилметакрилата сополимер \[1:1\] - 2,2 мг, метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер \[1:1\] \[30 % дисперсия\] - 7,7 мг, тальк - 5,6 мг, макрогол 6000 - 1,5 мг, соевых бобов масло очищенное - 0,8 мг, глицериды диацетилированные - 0,3 мг. * - представляет собой дрожжи Saccharomyces cerevisiae. ** - корпус и крышечка капсулы имеют одинаковый состав и цвет. *** - масса титана диоксида включена в общую массу желатиновой капсулы.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Профилактика у взрослых и детей с 2 лет: * профилактика дисбактериозов * поддержание иммунной системы (иммунитета), * профилактика антибиотик-ассоциированной диареи. Лечение у взрослых и детей с 2 лет: * диарея, вызванная острым и обострением хронического гастроэнтерита, * диарея, вызванная ротавирусной инфекцией, * антибиотик-ассоциированная диарея, * диарея путешественника (острая диарея, развивающаяся при путешествиях в другие климатические зоны), * в комплексной терапии острых кишечных инфекций, в комплексной терапии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как колит, синдром раздраженного кишечника и других желудочнокишечных расстройств функционального генеза, * нормализация микрофлоры кишечника, лечение дисбактериозов * непереносимость лактозы, * в составе комплексной стандартной эрадикационной терапии у пациентов с хеликобактерной инфекцией.

Способ применения и дозы

При острой диарее препарат необходимо принимать по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2-3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов. Для нормализации микрофлоры кишечника и поддержки иммунной системы препарат назначают в дозе 2-3 капсулы в сутки 10-21 день. Пациентам с непереносимостью лактозы рекомендуется принимать препарат по 1 капсуле 3 раза в сутки. При проведении эрадикационной терапии Бифиформ назначают по 2 капсулы 2 раза в день на протяжении двух недель с первого дня эрадикационной терапии. Детям с 2-х лет по 1 капсуле 2-3 раза в день. Длительность приема может быть скорректирована по рекомендации врача. При назначении детям и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее следует аккуратно надломить, осторожно, избегая потерь, высыпать содержимое в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости. При возникновении вопросов, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Бифиформ в период беременности и лактации считается безопасным, поскольку препарат не всасывается и не оказывает системного действия.

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах по установленным показаниям побочные эффекты не выявлены.

Передозировка

Симптомы передозировки ранее не зарегистрированы. В случае значительного превышения рекомендуемых доз целесообразно медицинское наблюдение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может быть использован в сочетании с другими лекарственными препаратами. Разрешается одновременное назначение с антибиотиками, в том числе с первого дня антибактериальной терапии для профилактики дисбактериоза и антибиотикассоциированной диареи.

Особые указания

Не следует превышать максимальную суточную дозу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.