Инструкция по применению
Билобил Форте Капсулы 80 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 80 мг

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

1 капсула содержит:сухой стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного 80 мг.100 мг экстракта содержат 19.2 мг флавоновых гликозидов гинкго и 4.8 мг терпеновых лактонов (гинкголиды и билобалиды).Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк, кремния оксид коллоидный безводный, магния стеарат.Состав оболочки капсулы: титана диоксид (E171) - 2.5602%, азорубин (E122) - 0.0471%, железа оксид красный (E172) - 0.1756%, краситель железа оксид черный (E172) - 0.0329%, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (развивающаяся вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, в пожилом возрасте), сопровождающаяся снижением внимания, ослаблением памяти, снижением интеллектуальных способностей, нарушением сна.Нарушение периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей, перемежающаяся хромота), синдром Рейно.Нейросенсорные нарушения (головокружение, звон в ушах, гипоакузия).Старческая дегенерация желтого пятна диабетическая ретинопатия.

Способ применения и дозы

Назначают по 1 капсуле Билобил Форте 2 раза в сутки (утром и вечером). Продолжительность курса лечения должна составлять не менее 3 мес, улучшение состояния отмечается через 1 мес терапии.

Противопоказания

Сниженная свертываемость крови. Эрозивный гастрит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Острые нарушения мозгового кровообращения.Острый инфаркт миокарда. Артериальная гипотензия. Детский возраст. Беременность. Лактация (грудное вскармливание). Повышенная чувствительность к компонентам билобил форте.