Инструкция по применению
Билобил Интенс 120 мг Капсулы 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 120 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

Капсулы 1 капс. активное вещество: гинкго двулопастного листьев экстракт сухой* 120 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 198 мг, крахмал кукурузный - 90 мг, тальк - 24 мг, кремния диоксид коллоидный - 6 мг, магния стеарат - 6 мг, декстроза жидкая (декстроза, олиго- и полисахариды) - 6 мг твердая желатиновая капсула (корпус и крышечка): краситель железа оксид черный (E172) - 0,1%, краситель железа оксид красный (E172) - 0,6%, титана диоксид (E171) - 1,33%, краситель железа оксид желтый (E172) - 0,27%, желатин - до 100%

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (развивающаяся вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, в пожилом возрасте), сопровождающаяся снижением внимания, ослаблением памяти, снижением интеллектуальных способностей, нарушением сна.Нарушение периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей, перемежающаяся хромота), синдром Рейно.Нейросенсорные нарушения (головокружение, звон в ушах, гипоакузия).Старческая дегенерация желтого пятна диабетическая ретинопатия.

Способ применения и дозы

Способ приминения Препарат принимают внутрь по 1 капс. 1-2 раза/сут. Капсулы следует проглатывать целиком, заливая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи. При двукратном режиме дозирования принимать утром и вечером, при однократном - желательно утром. Курс лечения - не менее 3 мес. Первые признаки улучшения состояния обычно появляются через 1 мес. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

Пониженная свертываемость крови. Эрозивный гастрит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. Острое нарушение мозгового кровообращения. Острый инфаркт миокарда. Беременность. Период грудного вскармливания. Галактоземия, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, т.к. В состав препарата билобил интенс 120 входит лактоза. Детский и подростковый возраст до 18 лет. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов ВОЗ очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до меньше 1/10), нечасто (от ≥1/1000 до меньше 1 /100), редко (от больше 1/10 000 до меньше 1/1000), очень редко (от меньше 1/10 000), частота неизвестна - не может быть оценена на основе имеющихся данных.В каждой группе нежелательные эффекты представлены в порядке уменьшения их серьезности.Со стороны пищеварительной системы очень редко - тошнота, рвота, диарея.Со стороны нервной системы очень редко - головная боль, головокружение, бессонница.Со стороны системы гемостаза очень редко - снижение свертываемости крови, кровотечение (при длительном применении у пациентов, одновременно принимавших препараты, снижающие свертываемость крови).Аллергические реакции очень редко - покраснение кожи, припухлость, кожный зуд.Прочие очень редко - нарушения слуха.В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений применение препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении