Инструкция по применению
Билобил Капсулы 40 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 40 мг



Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

Действующее вещество: Гинкго БилобаКонцентрация действующего вещества (мг): 40 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Билобил не предоставлены.

Показания

Бессонница (трудности при засыпании), связанная с повышенной нервной возбудимостью.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. Капсулы следует проглатывать, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения не менее 3-х месяцев. Первые признаки улучшения обычно появляются через 1 месяц. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пониженная свертываемость крови, эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. Перед хирургическим вмешательством необходимо сообщить врачу о применении препарата Билобил.При повторном появлении головокружения и шума в ушах пациент должен обратиться к врачу. В случае внезапного ухудшения или потери слуха нужно незамедлительно обратиться к врачу. Пациентам с кровоточивостью (геморрагическим диатезом) и пациентам, получающим антикоагулянтную терапию, необходимо проконсультироваться с врачом перед началом терапии препаратом Билобил.Билобил содержит декстрозу и лактозу, поэтому препарат не следует назначать пациентам с галактоземией, дефицитом лактазы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.Билобил содержит краситель азорубин (Е122), который может вызвать развитие аллергических реакций и бронхоспазма.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Побочные действия

Не рекомендуется применение препарата у пациентов, постоянно принимающих лекарственные средства, снижающие свертываемость крови (например, антикоагулянты (прямого и непрямого действия), ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС). Одновременное применение с этими препаратами может увеличить риск развития кровотечений вследствие удлинения времени свертывания.

Передозировка

В редких случаях возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсия, головная боль, снижение свертываемости крови.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

В настоящее время о случаях передозировки препарата Билобил не сообщалось.