**Инструкция по применению**
**Leonarda Бинт эластичный антимикробный 1,5 м х 8 см**

### Характеристики




Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Леонарда-сервис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

### Описание

Бинт медицинский эластичный антимикробный.Бинт представляет собой эластичное двухслойное основовязаное трикотажное полотно шириной от 40 до 120 мм, слои которого соединены между собой эластичными нитями, при этом по меньшей мере один из слоев полотна выполнен из синтетических нитей модифицированных аддитивом с антимикробным действием. Другой слой полотна выполнен из натуральной хлопчатобумажной пряжи. Растяжимость бинтов средняя.Антимикробные свойства при использовании бинта медицинского эластичного антимикробного достигнуты благодаря тому, что грунтовая многофиламентная антимикробная синтетическая нить , размещённая с изнаночной стороны бинта, постоянно находится в контакте с кожей, подавляет рост и препятствуют размножению грибков, грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также различных инфекций под бинтом.Преимущества бинта медицинского эластичного антимикробного: постоянный антимикробный эффект, высокая износостойкость (бинт служит намного дольше обычного бинта) повышенная форма устойчивость (после стирки не растягивается и не деформируется) адаптирован к применению в полевых условиях (антимикробные свойства)

### Состав

Лицевой слой бинта состоит из хлопчато-бумажной ткани.Внутренний (грунтовой) слой бинта состоит из синтетической многофиломентной антимикробной нити.

**Форма выпуска**

Бинт

**Показания**

Профилактика и лечение варикозной болезни, тромбофлибитов, предупреждение травм суставов, связок мышц, посттравматическое восстановление, помогает зафиксировать в нужном положении пострадавшую конечность.

**Способ применения и дозы**

Для достижения необходимого функционального результата, которого хотят добиться от применения эластического компрессионного бандажа, важно соблюдать следующие требования эластического бинтования нижних конечностей:1. Эластическое бинтование необходимо выполнять утром, до подъема с кровати, лучше лежа в постели.2. Повязку необходимо накладывать при тыльном сгибании стопы, равномерными витками без складок, чтобы исключить травму кожи при движении.3. Повязку всегда необходимо начинать от проксимальных суставов пальцев стопы с обязательным бинтованием пятки и формированием витком бинта т.н. замка, что исключит соскальзывание бинта при ходьбе.4. Рулон бинта необходимо раскручивать наружу в непосредственной близости от кожных покровов, что позволит исключить перерастягивание бинта и создание слишком высокой компрессии.5. Каждый тур бинта должен перекрывать предыдущий на 30 - 50%.6. Для лучшей фиксации эластического бинта на конечности, особенно на бедре, необходимо пользоваться наложением туров бинта попеременно в восходящем и нисходящем направлениях с формированием т.н. елочки.7. Проксимальный край компрессии должен на 10-15 см быть выше зоны клапанной недостаточности сегмента конечности.8. При наложении эластического бандажа в местах естественной деформации (область лодыжек) формы конечности, необходимо моделировать цилиндрический профиль конечности, используя латексные и поролоновые валики. При правильно наложенной компрессионной повязке в покое кончики пальцев слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения эластической повязки боль ного просят походить в течение 20—30 минут. Появление онемения пальцев стопы, ощущение пульсации под бинтами, появление болей означают неправильный выбор степени компрессии эластического бандажа и необходимость ее коррекции.Требования по уходу:Стирать бинт следует вручную мыльным раствором, по мере загрязнения, в воде при температуре до 40 °С. Аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Категорически запрещено глажение. Подготовка к работе изделия: подобрать бинт по длине, вскрыть упаковку, достать бинт, наложить на больную конечность и зафиксировать.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость к компонентам изделия, открытые раны, трофические язвы.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.