Инструкция по применению
Унга-СР Бинт эластичный медицинский средней растяжимости с застежкой велкро 3,5 м х 8 см

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Россия
Производитель: Тонус Эласт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «унга-ср» Профилактика и лечение начальных стадий варикозного расширения вен. Профилактика венозных заболеваний во время беременности и после родов. Лечебное давление до 14 мм рт. ст., I класс компрессии. Безопасность. Полная безопасность для здоровья достигается за счет большого содержания натурального хлопка. Это снижает риск развития аллергических реакций. Эффективность. В разработке приняли участие специалисты Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН. К тому же эффективность подтверждена клиническими исследованиями. Соблюдение всех отраслевых стандартов гарантирует высокое качество. Комфорт. Специальная многослойная технология улучшает паровлагообмен, позволяет коже дышать. Застёжка-липучка и оптимальная ширина полотна делают использование удобным. Долговечность. Использование современных материалов и европейских технологий делает изделия надёжными и долговечными. Сохраняет стабильную компрессию после многократных стирок.

Состав

Хлопок - 80%, полиэфир - 15%, лайкра - 5%.

Форма выпуска

Бинт

Показания

Для наложения компрессионных повязок: для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей, для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов, для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса, для снятия посттравматических отеков различной этиологии, для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека, для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии, для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1-C6.

Способ применения и дозы

При наложении повязки бинт раскручивается от себя. Начинайте бинтование от основания пальцев, растягивая бинт на 50-60% (пальцы оставьте свободными). Не старайтесь без необходимости растягивать бинт на всю возможную длину.Надежно зафиксируйте голеностопный сустав, обхватив бинтом пятку по типу гамачка. Далее, нисходящими и восходящими витками по типу восьмерки, продолжайте бинтовать голень. Следите за тем, чтобы каждый следующий виток перекрывал предыдущий наполовину.Приближаясь к коленному суставу, растяжение бинта слегка ослабьте. При необходимости такими же нисходящими и восходящими витками продолжайте накладывать бинт на колено и бедро.При окончании закрепите конец бинта с помощью застежки-липучки. Аналогично бинт накладывается на другие суставы или мышцы.Перед следующим использованием бинт нужно смотать в рулон. Начните сматывание с застежки. После чего загните ее вовнутрь и продолжите скручивать бинт в рулон.Способов наложения компрессионной повязки с использованием эластичного бинта много, лечащий врач может назначить пациенту и другие.

Противопоказания

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

Особые указания

Следуйте рекомендациям производителя, правильно ухаживайте за компрессионными изделиями. При необходимости стирайте и сушите их согласно инструкции, указанной на этикетке.Допускается ручная стирка с использованием средств предназначенных для трикотажных изделий.При необходимости можно гладить, температура минимальная.Не отжимать руками или в стиральной машине. Можно подсушить полотенцем.Сушить в расправленном виде на ровной поверхности.Хранить свернутым в рулон.При соблюдении правил ухода и бережном отношении к изделию, оно прослужит вам долго.