Инструкция по применению
Биофер Таблетки жевательные 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Индия
Производитель: Микро Лабс Лимитед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Железа [III] гидроксид полимальтозат+Фолиевая кислота
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 100 мг+ 350 мкг

Описание

Круглые таблетки темно-коричневого цвета с риской с одной стороны. Допускается наличие вкраплений более темного цвета.

Действующее вещество

Железа [III] гидроксид полимальтозат+Фолиевая кислота

Состав

В одной таблетке содержится: действующие вещества: железа (III) гидроксида полимальтозата - 318,2 мг, что эквивалентно элементному железу - 100,00 мг, фолиевой кислоты - 350 мкг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, маннитол, кремния диоксид коллоидный, карамель, метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидпроксибензоат натрия, натрия хлорид, тальк очищенный, аспартам, ароматизатор шоколадный, ароматизатор ванильный.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

Лечение латентного и клинически выраженного дефицита железа (железодефицитной анемии). Профилактика дефицита железа и фолиевой кислоты, в том числе, до, во время и после беременности (в период лактации).

Способ применения и дозы

Внутрь. Дозировка препарата и продолжительность терапии зависят от выраженности дефицита железа. Суточная доза препарата может приниматься один раз в день. Биофер в таблетках следует принимать во время или сразу после еды. Их можно разжевывать или глотать целиком. Дети старше 12 лет, взрослые и кормящие матери: лечение клинически выраженного дефицита железа (железодефицитной анемии) - по 1 таблетке 1-3 раза в день в течение 3-5 месяцев до нормализации уровня гемоглобина в крови. После этого, прием препарата следует продолжить в течение еще нескольких месяцев для того, чтобы восстановить запасы железа в организме (1 таблетка в день). Беременным женщинам следует принимать по 1 таблетке Биофера 2-3 раза в день до нормализации гемоглобина. Затем терапию следует продолжить в режиме по 1 таблетке 1 раз в день, как минимум, до родов для восстановления запасов железа. Для терапии латентного дефицита железа и для профилактики недостаточности железа и фолиевой кислоты, пациентам следует принимать по 1 таблетке препарата 1 раз в день. Продолжительность лечения железодефицитной анемии составляет 3-5 месяцев до нормализации запасов железа в организме, для беременных, как минимум, до родов. Продолжительность лечения латентного дефицита железа составляет 1-2 месяца.

Противопоказания

Возраст до 12 лет Перегрузка железом (гемохроматоз) Нарушение утилизации железа (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия) Нежелезодефицитные анемии (гемолитическая анемия, мегалобластная анемия, вызванная недостатком витамина B12).

Применение при беременности и кормлении грудью

В контролируемых исследованиях у беременных женщин во втором и третьем триместрах беременности не было отмечено нежелательного влияния препарата на мать и плод. Во время первого триместра беременности препарат следует применять только в том случае, если потенциальная польза от применения препарата у матери, превышает возможный риск для плода.

Побочные действия

Очень редко (больше или равно 0,001% и меньше 0,01%) могут отмечаться признаки раздражения желудочно-кишечного тракта, такие как ощущение переполнения, давления в эпигастральной области, тошнота, запор или диарея, а также аллергические реакции на фолиевую кислоту. Возможно темное окрашивание стула, обусловленное выделением невсосавшегося железа (клинического значения не имеет).

Передозировка

До настоящего времени в случаях передозировки препарата, не сообщалось ни об интоксикации, ни о признаках перегрузки железом.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Одна таблетка Биофера содержит 0,06 хлебные единицы, что необходимо учитывать при назначении пациентам с сахарным диабетом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

При температуре не выше 25°С в оригинальной упаковке (блистер в пачке). Хранить в местах, недоступных для детей.